

# Ornithologische Schnellmitteilungen für Baden-Württemberg

Informationsbrief

Neue Folge 66/67 (Dezember 2001)

Orn. Schnellmitt. Bad.-Württ. N.F. 66/67 (Dezember 2001)



Herausgeber:

Kuratorium für avifaunistische Forschung in Baden-Württemberg e.V.

Redaktion:

Jochen Hölzinger, Ulrich Mahler und Wilfried Schmid

Redaktionsanschrift:

Dr. Jochen Hölzinger, Auf der Schanz 23/2, D-71640 Ludwigsburg

Dokumentationsstelle für die Avifauna Baden-Württemberg

ISSN 0177-5464

Die »**Ornithologischen Schnellmitteilungen für Baden-Württemberg**« werden kostenlos an Mitarbeiter, die regelmäßig Beobachtungen für die »Avifauna Baden-Württemberg« einsenden, abgegeben. Die »Orn. Schnellmitt. Bad.-Württ. N.F.« erscheinen alle 3 Monate jeweils nach Abschluß der meteorologischen Jahreszeiten. Bei aktuellen Anlässen werden Sonderausgaben herausgegeben.

Ziel dieser Schnellmitteilungen ist es, Arbeitsvorhaben für die »Avifauna Baden-Württemberg« bekanntzugeben, aktuelle Beobachtungen aus der Vielzahl der bei der Dokumentationsstelle eingegangenen Daten zusammenzufassen und auf besondere Entwicklungen, wie Arealerweiterungen, Bestandsrückgänge und Invasionen, rechtzeitig hinzuweisen. Darüber hinaus wird in vierteljährlichen Abständen die Witterung der einzelnen Jahreszeiten für die Beurteilung des Brut- und Zuggeschehens zusammenfassend dargestellt.

Formulare für die Meldungen von Vogel-Beobachtungen könnten bei J. Hölzinger kostenlos angefordert werden. Die Richtlinien für die Mitarbeiter sind in der 1. Nummer der »Orn. Schnellmitt. Bad.-Württ. N.F.« abgedruckt. Dieses Heft senden wir gerne auf Anforderung zu.

Spendenkonto für die »Orn. Schnellmitt. Bad.-Württ.«: Konto-Nr. 4570 bei der Sparkasse Ulm (BLZ 630 500 00) unter Kuratorium für avifaunistische Forschung in Baden-Württemberg e.V., Ludwigsburg. Spendenbescheinigungen werden automatisch ausgestellt.

Die »**Ornithologischen Jahreshefte für Baden-Württemberg**« sind die Zeitschrift der baden-württembergischen Feldornithologen. Sie befaßt sich schwerpunktmäßig mit faunistischen Arbeiten aus Baden-Württemberg und den angrenzenden Gebieten. Bevorzugte Aufnahme finden Arbeiten zur Faunistik, Ökologie und Biologie, insbesondere Beiträge zur Habitatstruktur, zur Brutbiologie und zu den Wanderungen der Vögel. Regelmäßig erscheinende Sammelberichte und Übersichtsarbeiten sollen wichtige aktuelle faunistische Daten zusammenfassen.

»**Ökologie der Vögel**« ist als überregionale Zeitschrift zu Grundlagenthemen der Ornithologie konzipiert. Ziel der Zeitschrift ist es, Fakten und Probleme zu vermitteln, die Zusammenhänge aus dem Grenzbereich zwischen Umweltforschung und ornithologischer Feldarbeit erkennen lassen und zwar einerseits aus dem Bereich ungestörter Lebensgemeinschaften und andererseits aus den immer bedrohlicher werdenden Einwirkungen menschlicher Technik: Evolutive Anpassungen im Verhalten der Vögel, Eingliederung des Vogels in seine arteigene Sozialstruktur, Eingliederung des Vogels in seine synökologische Lebensgemeinschaft, morphologische und physiologische Anpassungen, Vögel im Bereich naturnaher Landwirtschaftsformen, Veränderungen und Zerstörungen des Lebensraums von Vögeln sowie Anreicherung und Wirkung belastender Chemikalien in Vögeln.

Die beiden Zeitschriften »Ornithologische Jahreshefte für Baden-Württemberg« und »Ökologie der Vögel« können bezogen werden, bei:  
Dr. Jochen Hölzinger, Auf der Schanz 23/2, D-71 640 Ludwigsburg.

## 1. Seltene Vogelarten in Baden-Württemberg 1999

### *Bericht der Avifaunistischen Kommission Baden-Württemberg*

Der erste Bericht über das Vorkommen seltener Vogelarten umfasst die eingegangenen Nachweise aus dem Jahr 1999. Obwohl einige Meldungen aus dem Jahre 1998 geprüft wurden, beginnt der Berichtszeitraum der Kommission ab 1999.

Daten, die von der Deutschen Seltenheitenkommission (DSK) bearbeitet werden, wurden an diese weitergeleitet und befinden sich dort in Bearbeitung. Die Daten, die direkt an die DSK gemeldet wurden, haben wir von dieser weitgehend erhalten.

Für die zahlreichen, meist gut dokumentierten, Meldungen von landes- und bundesweiten Seltenheiten sei an dieser Stelle nochmals herzlichst gedankt. Mittlerweile haben sich in allen Bundesländern regionale Kommissionen gebildet und ihre Arbeit aufgenommen.

Die regionalen Avifaunistischen Kommissionen dienen als Entlastung der DSK und der Überprüfung regionaler Seltenheiten und Extremdaten. Unser Ziel ist es, die Qualität der Beobachtungen in Baden-Württemberg dem nationalen und internationalen ornithologischen Stand anzugleichen.

Die bisherige Arbeit (Dateneingang, -weiterleitung, Zusammenarbeit mit der DSK) verlief weitgehend reibungslos, was uns für die Zukunft positiv stimmt. Wir sind durchaus bedacht, die Belange der Beobachter mit in unsere Arbeit zu integrieren, was bisher zu einer Vereinfachung bei den protokollpflichtigen Arten geführt hat (z.B. Streichung einiger Arten von der bisherigen Meldeliste). Wir möchten die Beobachter auch nach wie vor dazu ermutigen, uns über Verbesserungsvorschläge oder übersehene Fehler zu informieren.

Die bundesdeutsche Meldeliste für seltene Vogelarten hat sich rückwirkend zum Jahr 2001 geändert. Dies hat zur Folge, dass die Länderkommissionen in Zukunft mehr Arten bearbeiten werden. Die neue bundesdeutsche Meldeliste sowie die der verschiedenen Bundesländer werden in diesem Jahr in der Zeitschrift *Limicola* veröffentlicht (die Liste kann nach Erscheinen bei Dr. Jochen Hölzinger angefordert werden). Nach wie vor sind alle seltenen und dokumentationspflichtigen Arten an Dr. Jochen Hölzinger zu melden. Die aktuelle Meldeliste für seltene Vogelarten in Baden-Württemberg ist im Anhang aufgelistet. Der Bodensee hat aufgrund bislang verschiedener internationaler Listen eine einheitliche Meldeliste erstellt, dessen Arten von einem internationalen Team vor Ort eigenständig bearbeitet werden.

Das Bewusstsein, seltene Vogelarten möglichst genau zu dokumentieren ist bemerkenswert gewachsen. Die eingehenden Daten sind zunehmend von hoher Qualität, wodurch die Datengrundlage für die Avifauna Baden-Württemberg und den Bodensee-Raum in Zukunft qualitativ optimiert wird.

Im folgenden Bericht werden zunächst die ausführlich dokumentierten Beobachtungen aus dem Jahr 1999 dargestellt. Anschließend werden die Arten aufgeführt, deren Herkunft aus Gefangenschaft nicht ausgeschlossen werden kann. Die Nachweise, die nicht in die Datensammlung der Avifauna Baden-Württemberg aufgenommen werden, sollten auch in Zukunft nicht zitiert werden. Es sei hier ausdrücklich nochmals darauf hingewiesen, dass die Ablehnung einer Art keine Aussage über die Persönlichkeit oder die Qualität eines Beobachters hat! Zum Abschluss sind noch einige Arten aufgeführt, die ohne Dokumentation bei uns eingegangen sind und die bis auf weiteres nicht zitiert werden dürfen. Die Meldungen aus dem Jahr 1999 wurden von Tobias Epple, Matthias Hemprich, Daniel Kratzer, Klaus Schilhansl und Christian Wegst bearbeitet.

## Folgende Arten wurden in die Datensammlung der Avifauna Baden-Württemberg mit aufgenommen


Verwendete Abkürzungen: K 1 = Erstes Kalenderjahr (diesjährig), ad. = Altvogel, PK = Prachtkleid, SK = Schlichtkleid, W = Weibchen, M = Männchen, Ind. = Individuum.

### Baßtölpel (*Sula bassana*)

27.12.99 1 immat. (K 2./3.) durchziehend Nüstenbach MOS (A.Schröter)

### Nachtreiher, Seidenreiher, Silberreiher, Purpurreiher

Von diesen Arten wurden alle Meldungen in die Datensammlung übernommen



Der Winterbestand des Silberreiher (*Egretta alba*) hat in den letzten Jahren in Baden-Württemberg stark zugenommen. 1999 wurden deutlich mehr Silberreiher auf dem Heim- als auf dem Wegzug beobachtet. Nach wie vor ist die Alterszusammensetzung auftretender Silberreiher nicht bekannt.

### Ringelgans (*Branta bernicla*)

1.-2.1.99 3 Ind. Bodman KN (D.Kratzer, T.Epple, G.Nandi, S.Werner u.a.)

### Steinadler (*Aquila chrysaetos*)

26.4.99 1 ad. Waghbachniederung KA/HD (T.u.W.Lang)

*Steinadler-Beobachtungen sind im Vergleich zu früheren Jahren auffällig zurückgegangen.*

### Schreiadler (*Aquila pomarina*)

27.8.99 1 wohl K3 Flugplatz Eutingen TÜ/FDS (C.Wegst)

### Rauhfußbussard (*Buteo lagopus*)

25.1.99 1 ad. M Weilheim TÜ (C.Wegst)

6.2.99 1 K2 Ilshofen SHA (C.Wegst)

13.2.99 1 ad. Eriskircher Ried FN (M.Hemprich)

21.11.99 1 ad. W Eckenweiler TÜ (D.Kratzer, C.Pielsticker)

6.12.99 1 K 1 Rechtenstein UL (J.Günther)

### Rotfußfalke (*Falco vespertinus*)

Alle Meldungen wurden in die Datensammlung übernommen.

**Mornellregenpfeifer (*Charadrius morinellus*)**

8.5.99 1 Schliffkopf FDS (M.Förschler)

**Stelzenläufer (*Himantopus himantopus*)**

Alle Meldungen wurden in die Datensammlung übernommen.

**Teichwasserläufer (*Tringa stagnatilis*)**29.-30.4.99 2 ad. PK, am 1.u.2.5.99 nur noch 1 PK Rohrsee RV  
(W.Einsiedler, T.Epple, K.Pudimat, U.Grösser)

6.5.99 1 ad. PK Illerstausee Tannheim BC (W.Einsiedler)

**Steppenmöwe (*Larus cachinnans*)**

Die Steppenmöwe scheint außerhalb des Bodensees in vielen Teilen des Landes ein regelmäßiger aber spärlicher Durchzügler zu sein. Aufgrund regelmäßiger Fehlbestimmungen sollte diese Art in Zukunft ausführlich dokumentiert werden (an Sammelpätzen, wie z.B. am Oberrhein, reichen Sammelprotokolle aus).

**Dreizehenmöwe (*Rissa tridactyla*)**

17.1.99 1 ad. Knielinger See KA (J.Günther)

23.2.99 1 K2 Hafen Stuttgart S, Fotos (M.Schmolz)

**Brandseeschwalbe (*Sterna sandvicensis*)**

9.7.99 4 Ind. Friedrichshafen (M.Schleicher)

**Lachseeschwalbe (*Gelochelidon nilotica*)**

4.7.99 1 ad. PK Wollmatinger Ried KN (C.Gönner, S.Schwarz)

**Küstenseeschwalbe (*Sterna parasitica*)**

28.5.99 1 ad. PK Klärteiche Offenau HN (C.Wegst)

14.-18.7.99 1 K2 Queckbaggersee Bühl Tü (D.u.R.Kratzer, P.Sommer, A.Raidt, R.Schneider)

28.8.99 2 K1 Ermatinger Becken KN (J.Günther)

**Weißbart-Seeschwalbe (*Chlidonias hybridus*)**

Alle Frühjahrsnachweise wurden in die Datensammlung übernommen.

Herbst:

8.-15.10.99 1 K1 Rohrsee RV (R.Ortlieb, E.Schaefer, G.Heine, H.Roth)

**Weißflügel-Seeschwalbe (*Chlidonias leucopterus*)**

Alle Frühjahrsnachweise wurden in die Datensammlung übernommen.

26.-28.8.99 1 ad. Wägbachniederung KA/HD (I.Kling, T.u.W.Lang, C.Walter, C.Stohl)

**Ziegenmelker (*Caprimulgus europaeus*) - Extremdatum**

12.3.99 1 weibchenfarben Rübgarten RT (C.Wegst)

**Alpensegler (*Apus melba*)**

15.8.99 1 Ind. Wollmatinger Ried KN (C.Gönner)

10.5.99 1 Ind. Tübingen-Lustnau Tü (C.Dietz)

21.8.99 9 Ind. Laufenburg WT (R.Schlenker)

**Bienenfresser (*Merops apiaster*)**

10.5.99 mehrere rufend bei Mittelstadt RT (R.Armbruster)

8.9.99 1 Ind. Arnegger Ried UL (J.Hölzinger)

19.8.99 mind. 24 Taubergießen EM/OG (A.Andrzejczak)

**Schafstelze (*Motacilla flava*)**Merkmale der Unterart *M.f.flavissima*

4.5.99 1 ad. PK Klärteiche Offenau HN (C.Wegst)

31.8.99 1 ad. Wägbachniederung KA/HD (C.Randler, J.Blessing)

**Bachstelze** (*Motacilla alba*)

Merkmale der Unterart *M. a. yarrellii* (Trauerbachstelze)

6.5.99 1 ad. W Klärteiche Offenau HN (C.Wegst)

**Alpenbraunelle** (*Prunella collaris*)

10.4.99 1 Ind. Mädelesfels Schopfloch ES (J.Günther)

8.5.99 1 Ind. Belchen LÖ (M.Riebsell, H.Stadelmaier)

**Orpheusspötter** (*Hippolais polyglotta*)

29.-31.5.99 1 singend Tuniberg Opfingen FR (F.Bergmann)

6.6.99 1 singend NSG Büchsenberg Niederrottweil FR (J.Günther)

**Mauerläufer** (*Tichodroma muraria*)

26.2.-12.3.99 1 Ind. Wippingen UL (J.Müller, H.Müller, K.Schilhansl, R.Sammer u.a.)

**Karmingimpel** (*Carpodacus erythrinus*)

1. u. 22.7.99 1 K2 singend Randecker Maar ES (W.Lissak, W.Gatter)

**Spornammer** (*Calcarius lapponicus*)

6.10.99 1 K1 Segelflugplatz Ergenzingen TÜ/FDS (D.Kratzer)

**Möglicherweise, wahrscheinlich oder sicher entflozene Arten**

**Kuhreiher** (*Bubulcus ibis*)

8.7.99 1 PK Öpfinger Stausee UL (H.Müller, W.Dreher)

Obwohl man anhand der Nachweise in der Schweiz sicherlich davon ausgehen kann, dass die meisten Kuhreiher in Baden-Württemberg Wildvögel sind, ist eine Herkunft aus Gefangenschaft nicht sicher auszuschließen.

**Weißwangengans** (*Branta leucopsis*)

16.11.99 1 K1 Segelflugplatz Ergenzingen TÜ/FDS (D.Kratzer)

**Schwarzkopf-Ruderente** (*Oxyura jamaicensis*)

18.7.99 1 ad. W Martinsweiher Salem FN (C.Göner, K.Roth, D.Koch)

25.7.99 1 W Wagbachtal KA/HD (C.Wegst)

**Folgende Arten wurden aufgrund der Dokumentation nicht in die avifaunistische Datensammlung aufgenommen und sollten nicht zitiert werden! (auch Daten von 1998 und aktuell von 2000)**

**Rauhfußbussard** (*Buteo lagopus*)

9.1.00 1 ad. M Bodnegg RV (Beschreibung schließt Rauhfußbussard aus)

**Kleines Sumpfhuhn** (*Porzana parva*)

29.8.98 1 ad. M Wernauer Baggerseen ES (Beschreibung widersprüchlich)

**Zwergschnäpper** (*Ficedula parva*)

22.5.99 1 singend Feuerbachtal bei Zasenhausen S (Vogel wurde nur gehört, Beschreibung unzureichend)

**Berghänfling** (*Carduelis flavirostris*)

28.10.99 2 Ind. durchziehend Ruine Rauber ES (Beschreibung schließt andere Arten nicht aus)

Von folgenden Meldungen liegen bislang noch keine Beschreibungen vor

**Purpureiher**

7.11.99 1 Ind. Klärteiche Offenau HN (Extremdatum)

**Schwarzkopf-Ruderente**

Winter 98/99 1 Ind. Auf dem Bodensee bei Wangen KN

**Rauhfußbussard**

Ende Februar bis Anfang April 1999 1 Ind. Mönchzell HD

27.2.99 1 Ind. Karlsruhe-Rüppurr KA

**Kleines Sumpfhuhn**

31.7.99 1 K1 oder W Wollmatinger Ried

**Teichwasserläufer**

13.5.99 1 ad. PK Donaurieder Stausee UL

**Mornellregenpfeifer**

25.9.99 1 Ind. Sielmingen S

**Blauracke**

7.10.99 1 Ind. Wendlingen ES

**Schafstelze, Unterart: M.f.feldegg**

5.5.99 1 Ind. Klärteiche Offenau HN

**Orpheusspötter**

28.4.-3.5.99 1 singend Botanischer Garten Universität Heidelberg HD

13.5.99 1 Ind. Überlingen KN

5.-6.6.99 1 Ind. Moos KN

25.5. u. 10.7.99 1 Ind. Wagbachniederung KA/HD

16.6.99 2 Ind. Dürbheimer Ried TUT

**Sperbergrasmücke**

7.10.99 1 Ind. Wagbachniederung KA/HD

**Zwergschnäpper**

2.5.99 2 ad. singend Heiligenwald KÜN

**Karmingimpel**

30.10.99 1 ♀ gefangen Weissach BB

## Landesweite Meldeliste ab 2001


Nach Absprache mit den angrenzenden Seltenheitenkommissionen hat sich der Bodensee sinnvollerweise zu einer internationalen Kommission zur Bearbeitung seltener Vogelarten abgegrenzt. Einige Arten, die im Binnenland recht selten vorkommen, sind am Bodensee durchaus sehr regelmäßig anzutreffen und müssen demnach unterschiedlich dokumentiert werden.

Zu den hier aufgeführten Arten sollen alle Beobachtungen, die deutlich außerhalb der normalen Phänologie liegen (z.B. Purpurreiher im November), oder seltene Unterarten (z.B. Wanderfalke Unterart *calidus*) dokumentiert werden.

Legende zur Tabelle: - = nicht zu dokumentieren; X = uneingeschränkt zu dokumentieren; 1-12 = nur in diesen Monaten zu dokumentieren, M bedeutet dabei Mitte (z.B. 10-3 = nur zwischen Oktober und März zu dokumentieren).

Art	Baden-Württemberg	Bodensee
Ohrentaucher	-	7-8
Eissturmvogel	X	X
Basstölpel	X	X
Zwergdommel	-	12-3
Nachtreiher	-	11-2
Purpurreiher	-	11-M3
Kuhreiher	X	X
Saatgans (Unterart <i>fabalis</i> )	X	X
Kurzschmabelgans	X bei Verdacht auf Wildvogel	X
Zwerggans	X bei Verdacht auf Wildvogel	X
Weißwangengans	X bei Verdacht auf Wildvogel	X bei Verdacht auf Wildvogel
Ringelgans (Unterart <i>bernicla</i> )	X bei Verdacht auf Wildvogel	X bei Verdacht auf Wildvogel
Ringelgans (Unterart <i>brota</i> )	X bei Verdacht auf Wildvogel	X bei Verdacht auf Wildvogel
Rothalsgans	X bei Verdacht auf Wildvogel	X bei Verdacht auf Wildvogel
Schwarzkopf-Ruderente	X	X
Seeadler	-	X
Steinadler	X	-
Schreiadler	X	X
Mäusebussard Unterart <i>vulpinus</i>	X	X
Rauhfußbussard	X	X
Kleines Sumpfhuhn	X	X
Rotfußfalke	-	11-3
Großtrappe	X	X
Mornellregenpfeifer	X	12-3
Seeregenpfeifer	X	X
Sumpfläufer	X	X
Odinshühnchen	X	X
Teichwasserläufer	X	6-3
Spatelraubmöve	X	X
Schmarotzerraubmöve	X	X
Falkenraubmöve	X	X
Skua	X	X
Silbermöve	-	X
(inkl. Variation „omissus“)		

Art	Baden-Württemberg	Bodensee
Steppenmöwe	X	-
Mantelmöwe	X nur juv. und immat.	-
Großmöwen-Hybriden	X	X
Dreizehenmöwe	X	5-8
Lachseeschwalbe	X	X
Küstenseeschwalben	X	X
Zwergseeschwalbe	M10-3	M10-3
Weißbart-Seeschwalbe	8-3	8-3
Weißflügel-Seeschwalbe	8-3	8-3
Trottellumme	X	X
Tordalk	X	X
Gryllteiste	X	X
Krabbenraucher	X	X
Alpensegler	-	12-2
Bienenfresser	-	11-3
Blauracke	X	X
Weißrückenspecht	außerhalb bekannter Brutgebiete	X
Dreizehenspecht	außerhalb bekannter Brutgebiete	X
Felsenschwalbe	X	X
Schafstelze (Unterart <i>flavissima</i> )	X	X
Bachstelze (Unterart <i>jarrellii</i> )	X	X
Wasseramsel (Unterart <i>cinclus</i> )	X	X
Alpenbraunelle	X	X
Sprosser	X	X
Blaukehlchen (Unterart <i>svecica</i> )	X	X
Schlagschwirl	-	8-4
Seggenrohrsänger	X	X
Orpheusspötter	X	X
Sperbergrasmücke	X	X
Berglaubsänger	außerhalb bekannter Brutgebiete	10-3
Halsbandschnäpper	außerhalb bekannter Brutgebiete	X
Zwergschnäpper	X	X
Rotkopfwürger	außerhalb bekannter Brutgebiet	8-3
Alpendohle	X	X
Dohle (Unterart <i>sommerringii</i> )	X	X
Tannenhäher (Unterart <i>macrorhynchos</i> )	X	X
Schneesperling	X	X
Zitronengirlitz	außerhalb bekannter Brutgebiete	außerhalb bek. Brutgebiete
Karmingsimpel	8-4	8-4
Berghänfling	X	X
Taigabirkenzeisig	X	X
Zaunammer	außerhalb bekannter Brutgebiete	-
Zippammer	außerhalb bekannter Brutgebiete	-
Spornammer	X	X



## 2. Zwei neue Bände der Avifauna Baden-Württemberg soeben erschienen:

- **Die Vögel Baden-Württembergs Band 2.2 Non-Passeriformes - Nicht-Singvögel (Teil 2): Rauhußhühner (Tetraonidae) – Alken (Alcidae)**  
 Bearbeitet von Jochen Hölzinger und Martin Boschert  
 Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart. 2001. 880 Seiten, 695 Abbildungen, 125 Tabellen, 31 Farbfotos auf 16 Tafeln.  
 In diesem Band werden die in Baden-Württemberg nachgewiesenen Arten der Familien Hühner-  
 vögel, Hühner, Perlhühner, Truthühner, Rallen, Kraniche, Trappen, Austernfischer, Stelzenläu-  
 fer, Triele, Brachschwalben, Regenpfeifer, Schnepfen, Raubmöwen, Möwen, Seeschwalben und  
 Alken abgehandelt.
- **Die Vögel Baden-Württembergs Band 2.3 Non-Passeriformes - Nicht-Singvögel (Teil 3): Flughühner (Pteroclididae) – Spechte (Picidae)**  
 Bearbeitet von Jochen Hölzinger und Ulrich Mahler  
 Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart. 2001. 650 Seiten, 385 Abbildungen, 120 Tabellen, 30 Farbfotos auf 16 Tafeln.  
 In diesem Band werden folgende in Baden-Württemberg nachgewiesene Arten der Familien  
 Flughühner, Tauben, Kleinpapageien, Eigentliche Papageien, Edelpapageien, Kuckucke, Schlei-  
 erulen, Eulen, Nachtschwalben, Segler, Eisvögel, Bienenfresser, Racken, Wiedehopfe und Spechte.  
 Die Mitarbeiter an diesen Bänden erhalten vom Ulmer-Verlag schriftlich ein Sonderangebot, das im  
 Januar 2002 verschickt wird.

### **3. Die Vögel Baden-Württembergs – Ergänzungslieferungen**

In Kürze erscheint die 2. Lieferung der Schriftenreihe „Die Vögel Baden-Württembergs – Ergänzungslieferungen“. Abgehandelt werden die folgenden Arten: Zebrafink, Muskatamadine, Brauohrsittich, Singsittich und Rotbugamazone. Die 1. Lieferung enthält die Arten: Meisenwalsänger und Isabellwürger. Beide Lieferungen können bei Dr. Jochen Hölzinger (Auf der Schanz 23/2, D-71640 Ludwigsburg) bestellt werden.

### **4. Vogelzug und Vogelbestände in Mitteleuropa. 30 Jahre Beobachtung des Tagzugs am Randecker Maar**

Bearbeitet von Wulf Gatter

AULA-Verlag, Wiebelsheim. 2000. 656 S., 425 Abb., 16 Farbtafeln.

Wir verweisen auf die folgenden ausführlichen Besprechungen: P. Berthold in: Die Naturwissenschaften 2002; E. Bezzel in: Der Falke 48, 2001: 120-121; V. Dierschke in: Journal für Ornithologie 142, 2001: 483-485; M. Flade in: Die Vogelwelt 122, 2001: 228-229.

### **5. Spechte, Wald und Höhlennutzung**

In den „Abhandlungen und Berichten aus dem Museum Heineanum“ Bd. 5 erschien 2001 das Sonderheft „Spechte, Wald und Höhlennutzung“ (ISSN 0947-1057). Der Band, der Prof. Dr. Wilhelm Meise zum 100. Geburtstag gewidmet ist, enthält 11 Beiträge, die im wesentlichen als Vorträge auf der Tagung der Projektgruppe Spechte der Deutschen Ornithologen-Gesellschaft (DO-G) auf Einladung des Museums Heineanum in Halberstadt gehalten wurden und jetzt in überarbeiteter und teilweise stark erweiterten Form erschienen sind. Das Sonderheft kann beim Förderkreis Museum Heineanum e.V., Domplatz 37, D-38820 Halberstadt (Tel. 03941/551460, Fax. 03941/5514690) bezogen werden.

### **6. Dank an die Spender**

Der Aufruf zur Unterstützung der Finanzierung der „Ornithologischen Schnellmitteilungen für Baden-Württemberg“ brachte 2001 erfreulicherweise viele Spenden, für die wir auch an dieser Stelle herzlichen Dank sagen. Insgesamt gingen 6940.- DM ein, so daß die Kosten für die umfangreiche Ausgabe Nr. 65 (April 2001) mit Briefversand davon finanziert werden konnte. – Zusammen mit der nächsten Ausgabe der „Schnellmitteilungen“ soll das umfangreiche Register zu den Ausgaben Nr. 43/44 (1994) bis 66/67 (Dezember 2001) erscheinen. Wir wären sehr dankbar, wenn Sie dieses Projekt durch Spenden unterstützen würden. Das Spendenkonto lautet: Konto-Nr. 4570 bei der Sparkasse Ulm, BLZ 630 500 00, unter „Kuratorium für Avifauna“.

## Die Witterung im Frühjahr 2001

Zusammengestellt von **Jochen Hölzinger** nach Daten des Deutschen Wetterdienstes

Der **März 2001** (Tab. 1) war in ganz Baden-Württemberg wie auch in Bayern deutlich zu warm (im Gegensatz zum Norden und Osten Deutschlands, wo es zu kalt war). Die Abweichungen vom langjährigen Mittel (1961-1990) lagen ziemlich einheitlich zwischen 2.0 und 2.6 Kelvin (Stuttgart-Flughafen). Der Monat war in allen Landesteilen deutlich zu nass. Das Niederschlagssoll wurde landesweit mit 254 % vom langjährigen Mittel erheblich überschritten. Anhaltende Niederschläge am 14. und 15. brachten dem Rhein das erste Hochwasser. Bei Karlsruhe wurde der Rhein für die Schifffahrt gesperrt. Vom 21. bis 25. Verursachten Dauerniederschläge an Rhein, Donau und Neckar Hochwasserstände. Die Sonnenscheindauer erreichte nur deutlich unterdurchschnittliche Werte, die in allen Landesteilen um die 50 %-Marke des langjährigen Mittels schwankten.

	Temp. (°C) (K)	Abweichung v. langj.Mittel	Sommer- Frost- tage Mittel	Niederschlag in mm % v. langj. decke	Tage mit Schnee- Mittel	Sonnenschein in Stunden % v.langj.			
Karlsruhe	8.0	2.0	–	2	134	253	1	74	61
Stuttgart	7.0	2.2	–	4	100	256	–	70	56
Öhringen	6.8	2.1	–	5	139	221	3	64	52
Freiburg	9.0	2.4	–	1	158	247	2	64	52
Freudenstadt	4.1	2.3	–	14	371	247	12	37	31
Klippeneck	3.6	2.3	–	13	140	250	*	49	37
Ulm	5.5	2.0	–	6	153	348	4	65	52
Feldberg	0.6	2.4	–	22	299	202	30	40	37
Konstanz	7.1	2.4	–	2	146	286	3	63	50

Gesamtniederschlag (Flächenmittel Baden-Württemberg) 174 mm (254% v.M.)

\* = keine Daten vorliegend

Tab. 1. März 2001

Der **April 2001** (Tab. 2) war im ganzen Land mit einer durchschnittlichen Abweichung vom langjährigen Mittel von –1 Kelvin zu kalt und überwiegend, vor allem im Schwarzwald und in der Oberrheinebene, zu nass. Lediglich im Hügelland der unteren Riss und in der Donauniederung bei Ulm war es zu trocken. Der Gesamtniederschlag im Flächenmittel über Baden-Württemberg lag mit 117 % des langjährigen Mittels über dem Soll. Die Mittelgebirge oberhalb von etwa 1000 m NN hatten den ganzen Monat über eine geschlossene Schneedecke. Die Sonnenscheindauer lag in weiten Teilen Baden-Württembergs deutlich unter dem langjährigen Mittel.

Der **Mai 2001** (Tab. 3) war über den Monat hinweg im ganzen Land deutlich zu warm mit Abweichungen vom langjährigen Mittel von etwa 3 Kelvin und Höchstwerten von bis zu 3.4 Kelvin (Konstanz). In der Oberrheinebene waren bereits über 10, in Karlsruhe sogar 15 Sommertage (Max.

>=25.0°C) zu verzeichnen. Im Bodenseebecken wurden 9 Sommertage erreicht. Der mittlere Neckarraum kam immerhin auf 7 Sommertage. Lediglich in den Mittelgebirgen konnten keine Sommertage registriert werden. Der Monat war insgesamt im ganzen Land mit nur 62 % des Gesamtniederschlags vom langjährigen Mittel markant zu trocken. Nur auf dem Feldberg wurde das Niederschlagsoll geringfügig überschritten. Hier war auch am 2.5. mit 16 cm und am 3.5. mit 14 cm eine geschlossene Schneedecke vorhanden. Die Sonnenscheindauer war in ganz Baden-Württemberg deutlich überdurchschnittlich.

	Temp. (°C) (K)	Abweichung v. langj.Mittel	Sommer- tage	Frost- tage Mittel	Niederschlag in mm % v. langj. decke		Tage mit Schnee- Mittel	Sonnenschein in Stunden % v.langj.	
Karlsruhe	9.0	-0.9	—	2	81	133	—	136	84
Stuttgart**	7.4	-0.6	—	5	64	107	2	*	*
Öhringen	7.9	-0.7	—	5	71	111	2	128	79
Freiburg	9.3	-0.9	—	1	114	141	—	105	66
Freudenstadt	4.1	-1.2	—	11	196	158	11	101	66
Klippeneck	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Ulm	6.5	-1.2	—	6	51	88	4	116	71
Feldberg	-0.4	-1.4	—	23	162	116	28	79	59
Konstanz	7.6	-1.1	—	2	70	103	2	125	77

Gesamtniederschlag (Flächenmittel Baden-Württemberg) 92 mm (117% v.M.)

\* keine Werte vorliegend

\*\* Flughafen (vom Schnarrenberg keine Werte vorliegend)

Tab. 2. April 2001

	Temp. (°C) (K)	Abweichung v. langj.Mittel	Sommer- tage	Frost- tage Mittel	Niederschlag in mm % v. langj. decke		Tage mit Schnee- Mittel	Sonnenschein in Stunden % v.langj.	
Karlsruhe	17.2	2.9	15	—	37	47	—	267	127
Stuttgart	16.5	3.2	7	—	30	36	—	260	131
Öhringen	16.0	2.9	7	—	31	36	—	275	133
Freiburg	17.6	3.2	13	—	99	93	—	254	128
Freudenstadt	12.5	2.7	—	—	67	52	—	241	126
Klippeneck	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Ulm	15.0	2.8	5	—	62	81	—	258	126
Feldberg	8.6	3.3	—	—	174	105	2	221	137
Konstanz	16.5	3.4	9	—	72	85	—	261	131

Gesamtniederschlag (Flächenmittel Baden-Württemberg) 59 mm (62% v.M.)

\* = keine Werte vorliegend

Tab. 3. Mai 2001

## Die Sommer im Sommer 2001

Zusammengestellt von **Jochen Hölzinger** nach Daten des Deutschen Wetterdienstes

Der **Juni 2001** (Tab. 1) war landesweit zu kalt mit Abweichungen vom langjährigen Mittel von  $-0.3$  bis  $-1.1$  Kelvin und überwiegend zu nass. Der Gesamtniederschlag liegt mit  $105\%$  vom langjährigen Mittel nur geringfügig über dem Niederschlagssoll, regional gab es aber deutliche Unterschiede. In der südlichen Oberrheinebene, im Schwarzwald, im Hegau, im Bodenseebecken und im Allgäu war es zum Teil deutlich zu naß, während es in der Donauniederung und in den Kocher-Jagst-Ebenen deutlich zu trocken war. Auf dem Feldberg gab es vom 3. bis 7.6. eine geschlossene Schneedecke von bis zu  $11$  cm Höhe. Die Sonnenscheindauer lag überwiegend leicht über dem langjährigen Mittel. Die höchste Zahl der Sommertage ( $\geq 25.0^\circ\text{C}$ ) mit 8-9 Tagen erreichten das Oberrheingebiet und das Bodenseebecken.

	Temp. (°C) (K)	Abweichung v. langj.Mittel	Sommer- tage	Frost- tage Mittel	Niederschlag in mm % v. langj. decke		Tage mit Schnee- Mittel	Sonnenschein in Stunden % v. langj.	
Karlsruhe	16.9	-0.6	9	—	80	93	—	241	110
Stuttgart	15.9	-0.5	7	—	96	103	—	222	106
Öhringen	15.4	-0.8	7	—	74	79	—	208	98
Freiburg	17.3	-0.4	8	—	159	136	—	240	108
Freudenstadt	12.4	-0.6	3	—	173	126	—	213	104
Klippeneck	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Ulm	14.3	-1.1	4	—	74	74	—	228	102
Feldberg	8.1	-0.3	0	3	218	127	3	191	107
Konstanz	15.9	-0.4	8	—	111	106	—	235	108

Gesamtniederschlag (Flächenmittel Baden-Württemberg) 113 mm ( $105\%$  v.M.)

\* = keine Daten vorliegend

Tab. 1. Juni 2001

Der **Juli 2001** (Tab. 2) war gemessen am langjährigen Mittel (1961-1990) deutlich zu warm mit Abweichungen von bis zu  $1.6$  Kelvin (Karlsruhe und Stuttgart) und überwiegend zu trocken. Der Gesamtniederschlag im Flächenmittel über Baden-Württemberg lag bei  $79\%$  vom langjährigen Mittel. Lokal, z.B. in der südlichen Oberrheinebene und auf der Südwest-Alb war es allerdings geringfügig zu nass. Die Zahl der Sommertage ( $\geq 25^\circ\text{C}$ ) erreichte mit 20 Tagen in Karlsruhe den höchsten Wert. Der Juli 2001 war im Vergleich zum Juli 2000 ein echter Hochsommermonat. Die Monatsmittel der Lufttemperatur lagen unterhalb von etwa  $800$  m NN generell über  $17.0^\circ\text{C}$  und erreichten im Oberrheingebiet bis zu  $21.2^\circ\text{C}$  (Karlsruhe). Die Sonnenscheindauer war landesweit überdurchschnittlich.

	Temp. (°C) (K)	Abweichung v. langj.Mittel	Sommer- tage	Frost- tage Mittel	Niederschlag in mm % v. langj. decke	Tage mit Schnee- Mittel	Sonnenschein in Stunden % v.langj.		
Karlsruhe	21.2	1.6	20	–	48	69	–	297	122
Stuttgart**	20.0	1.6	14	–	46	73	–	270	113
Öhringen	19.5	1.5	14	–	42	56	–	278	117
Freiburg	21.0	1.1	17	–	110	115	–	275	109
Freudenstadt	16.3	1.1	9	–	113	98	–	248	103
Klippeneck	15.9	1.0	6	–	97	108	–	256	104
Ulm	18.3	0.9	13	–	58	72	–	269	108
Feldberg	11.9	1.0	–	–	149	92	–	211	99
Konstanz	19.8	1.3	18	–	61	60	–	277	113

Gesamtniederschlag (Flächenmittel Baden-Württemberg) 72 mm (79% v.M.)

Tab. 2. Juli 2001

	Temp. (°C) (K)	Abweichung v. langj.Mittel	Sommer- tage	Frost- tage Mittel	Niederschlag in mm % v. langj. decke	Tage mit Schnee- Mittel	Sonnenschein in Stunden % v.langj.		
Karlsruhe	21.2	2.4	25	–	32	48	–	257	116
Stuttgart	20.7	2.8	19	–	31	41	–	235	110
Öhringen	19.9	2.5	17	–	48	63	–	250	117
Freiburg	21.9	2.7	22	–	52	51	–	259	114
Freudenstadt	17.2	2.5	11	–	62	55	–	242	113
Klippeneck	17.0	2.6	10	–	71	65	–	229	103
Ulm	18.9	2.4	12	–	67	81	–	246	112
Feldberg	13.0	2.4	–	–	102	61	–	215	112
Konstanz	20.0	2.3	17	–	73	83	–	248	115

Gesamtniederschlag (Flächenmittel Baden-Württemberg) 62 mm (66% v.M.)

Tab. 3. August 2001

Der **August 2001** (Tab. 3) war markant zu warm mit Abweichungen vom langjährigen Mittel (1961-1990) von mindestens 2.3 Kelvin (Konstanz) und bis zu 2.8 Kelvin (Stuttgart) und deutlich zu trocken. In Karlsruhe gab es am 15.8. mit 26.7°C und am 24.8. mit 24.9°C neue Temperaturrekorde innerhalb der über 100-jährigen Beobachtungsreihen mit Überschreitungen der bisherigen Höchstwerte um 0.9 bzw. 0.4 Kelvin. Der Gesamtniederschlag für Baden-Württemberg betrug lediglich 66 % vom langjährigen Mittel. In der nördlichen Oberrheinebene und im Neckarbecken lagen die mittleren Niederschlagsmengen unter 50 % vom langjährigen Mittel, z.B. in Karlsruhe bei 48 % und in Stuttgart bei 41 %. Wie im Juli war die Sonnenscheindauer auch in diesem Monat überdurchschnittlich.

**Aktuelle Beobachtungen im Jahr 2001 (Folge 52)**  
zusammengestellt von **Jochen Hölzinger, Ulrich Mahler und Christian Stohl**

**Zusammenfassung:**

- wieder recht viele Rohrdommeln im Winterhalbjahr, aber auch rufende zur Brutzeit
- weiter zahlreiche Beobachtungen von Silberreiern (im ganzen Land und ganzjährig)
- viele durchziehende Schwarzstörche
- Seidenschwanz-Invasion mit hohem Zahlen v.a. am Bodensee
- späte Wegzugbeobachtungen von Rohrweihe, Fischadler, Wachtel, Tüpfelsumpfhuhn und Kranich
- Winterbeobachtungen von Grünschenkel, Schwarzkehlchen, Mönchsgrasmücke und Beutelmeise
- Überwinterung von Zwergstrandläufer, Kampfläufer, Zwergschnepfe, Zwergmöwe, Hausrotschwanz, Zilpzalp und Zippammer
- weiterhin recht viele Eistaucher-Beobachtungen
- und folgende weitere Seltenheiten\*: Zwergscharbe, Kuh- und Rallenreiher, Rothalsgans, Blauflügel-, Marmel-, Kleine Berg- und Büffelkopfente, Steppenweihe, See-, Schlangen-, Schell-, Schrei-, Stein- und Zwergadler, Adlerbussard, Würgfalk, Kleines Sumpfhuhn, Austernfischer, Stelzenläufer, Säbelschnäbler, See- und Mornellregenpfeifer, Steppenkiebitz, Graubruststrandläufer, Meerstrandläufer, Doppelschnepfe, Pfuhlschnepfe, Teichwasserläufer, Steinwäzler, Odinshühnchen, Thorshühnchen, Schmarotzerraubmöwe, Skua, Schwalben-, Dünnschnabel- und Dreizehenmöwe, Raub-, Brand-, Küsten- und Zwergseeschwalbe, Blauracke, Weißrückenspecht, Felsenschwalbe, Rötelschwalbe, Zitronenstelze, Mariskensänger, Orpheusspötter, Weißbartgrasmücke, Grün- und Gelbbräunlaubsänger, Rosenstar, Karmingimpel

**Die Beobachtungen im einzelnen:**

**Sternaucher:** 1-2 juv. vom 7.1.-23.1.2001 bei Kappel OG (I.Birkhold, H.Fiebig, W.Finkbeiner, K.Golz, T.u.W.Lang, H.Püschel, M.u.T.Reiser, M.Schulz, E.Stengele, F.Straub, H.-D.Weber) und 1 am 10.2.2001 auf dem Rheinstau Freistett OG (W.Jansen). Auf dem Bodensee 1 am 28.1. (M.Basen\*) und am 18.2.2001 (J.Günther) auf dem Untersee KN, bis zu 4 am 6.2.2001 im Rheindelta (J.Ulmer<sup>1</sup>) und bis zu 3 am 12.2.2001 im Etiskircher Ried FN (L.Ramos<sup>1</sup>), hier 8 vom 29.-30.4. (O.Graf, M.Hemprich, G.Knötzsch & M.Schleicher<sup>2</sup> sowie W.Frenz<sup>2</sup>) und 1 am 15.5.2001 (M.Hemprich & M.Schleicher<sup>2</sup>). Dann wieder je 1 vom 18.-25.11.2001 auf dem Faiminger Stausee DLG (K.Schilhansl, M.Rau, T.Epple) und am 1.12.2001 auf dem Roxheimer Silbersee LU (V.Schmidt\*).

**Prachtaucher:** Je 1 vom 12.-13.1.2001 auf den Wernauer Baggerseen ES (P.Steck, J.Deuschle) und am 18.3.2001 auf dem Neckar in Esslingen (H.Michels\*), dann wieder 1 am 25.11.2001 auf den Fetzer Seen DLG (T.Epple). Auf der „Seetaucherstrecke“ des Bodensees max 32 am 4.12.2000, im Januar 2001 nur noch 9-10 (z.B. 7 am 28.1., M.Basen\*) und am 7.2.2001 wieder 33 (P.Willi & W.Zanola<sup>1</sup>), hier die letzten 4 am 30.4.2001 (H.Leuzinger & U.Rindlisbacher<sup>2</sup>), außerdem 6 am 6.1.2001 bei Fischbach FN (W.Einsiedler), mind. 5 am 16.1.2001 bei Friedrichshafen (D.Koch\*) und 2 am 21.1.2001 auf dem Untersee KN (M.Basen\*), dann noch 3 am 6.5. (G.Knötzsch & M.Schleicher<sup>2</sup>), 8 am 14.5. (W.Frenz<sup>2</sup>) und 9 am 15.5.2001 (G.Knötzsch & M.Schleicher<sup>2</sup>) im Etiskircher Ried FN sowie 2 im PK noch am 3.6.2001 vor Bodman FN (J.Mayer<sup>1</sup>), dann wieder 9 am 11.11.2001 vor Hagnau FN (W.Backhaus).

**Eistaucher\*:** Nachtrag: 1 leukistischer juv. vom 24.-29.12.2000 auf dem Neckar bei Lauffen HN (C.Randler, J.Blessing, H.Furrington u.a.<sup>1</sup>). Um die Jahreswende wohl 3 (je 1 ad., 1.KJ und 2.KJ)

gleichzeitig auf der „Seetaucherstrecke“ des Bodensees (P.Willi<sup>1</sup>), hier wieder 3 am 10.2.2001 (G.Juen & S.Trösch<sup>1</sup>), dann 1 ad. bis 7.3. (H.Leuzinger & P.Willi<sup>1</sup>) und 2 immat. am 28.2.2001 (S.Schuster<sup>1</sup>) und schließlich 3 vom 27.-30.4.2001 (H.Leuzinger & U.Rindlisbacher<sup>2</sup>) ebenda, außerdem 1 am 4.1. bei Fischbach FN und 2 am 5.1.2001 bei Immenstaad FN (W.Frenz, O.Graf & G.Knötzsch<sup>2</sup>). Ansonsten je 1 (1.W) vom 14.1.-3.2.2001 im Mannheimer Mühlhahnen (C.Dietzen, G.Freundlieb, M.Kloiber, A.Stöhr, C.Stohl u.a. M.Feuersenger, C.Dietzen, A.Stöhr u.a.; C.Dietzen, B.Giessing, J.Schabacka, M.Wink, C.Stohl & L.Nau\*) und vom 28.1.-24.2.2001 auf dem Rheinstau Freistett OG (M.u.W.Jansen). Dann wieder 1 am 2.12.2001 auf der „Seetaucherstrecke“ des Bodensees (M.Basen\*).

**Ohrentaucher:** 2-3 zwischen 27.12.2000 (A.Hachenberg<sup>1</sup>) und 24.2.2001 (A.Zanola<sup>1</sup>) auf dem Bodensee bei Landschlacht-Güttingen/Schweiz, 2 am 8.1.2001 bei Weisweil EM (M.Schilz), je 1 am 13.1.2001 in der Wagbachniederung KA/HD (M.Wink\*), am 23.1.2001 bei Village-Neuf/Elsafß (E.Gabler), am 28.1.2001 auf dem Untersee KN (M.Basen\*), am 18.2.2001 bei Horn KN (J.Günther, C.Kiefer), im PK am 21.4.2001 auf dem Roxheimer Altrhein LU (M.Wink\*), ebenfalls im PK am 5.6.2001 (bereits seit etwa 6 Wochen) auf einem Baggersee bei Durmersheim RA (F.Scholler, U.Mahler, G.Müller) und am 31.8.2001 auf dem Breitenauer See HN (M.Wieland).

**Schwarzhalstaucher:** 11 am 29.4.2001 auf dem Breitenauer See HN (M.Wieland) und 96 am 2.5.2001 auf dem Rohrsee RV (E.Schaefer).

**Zwergscharbe\*:** 1 am 10.5. im Rheindelta (J.Ulmer) und ab 11.5. bis Ende September 2001 mit Kormoranen am Untersee KN (T.Epple, D.Kratzer, G.Nandi, S.Olschewski, U.Pitius, A.Torkler; M.Basen, H.Fries, D.Heuschen, S.Hüsges, H.Jacoby, B.Porer, S.Werner u.a.<sup>2,3</sup>; H.u.L.Reinhardt, U.v.Wicht u.a.<sup>8</sup>).

**Zwergdommel:** 0,1 am 14.7.2001 an den Kiesecken Rißtissen UK (G.u.R.Armbruster), 1 am 23.9. an den Baggerseen Krauchenwies SIG (K.F.Gauggel, M.Sindt) und 2 noch am 29.9.2001 am Federsee BC (K.F.Gauggel, D.Haas).

**Rohrdommel:** Je 1 vom 3.1.-18.2.2001 bei Kappel OG (R.Birkenberger, G.Dobler, W.Finkbeiner, S.Kaiser, J.Ruf, J.Rupp, F.Saumer, H.-D.Weber, J.Wiegand), am 14.1.2001 am Neupotzer Altrhein GER (K.Bögelspacher\*) und am 25.2.2001 am Baggersee Hochstetten KA (G.Wöhrlé), 3 rufend am 31.3.2001 am Federsee BC (E.Kirsinger, R.Kühnle), dann je 1 am 8.9.2001 am Schmiechener See UL (K.Anka, G.u.R.Armbruster) und am 18.11.2001 am Metzisweiler Weiher RV (W.Backhaus). In der Wagbachniederung KA/HD je 1 am 6.1. (F.Scholler) und 14.1. (G.Freundlieb), dann ständig 1-3 vom 6.-29.3. (G.Freundlieb, U.Mahler, C.Stohl, C.Walter; C.Dietzen\*), je 1 am 30.4. (G.Freundlieb; J.Hönle\*) sowie vom 20.-21.9. (G.Freundlieb; S.Murray\*), vom 7.-10.10. (fide C.Walter) und am 4.11.2001 (F.Scholler). Am Bodensee durchgehende Überwinterung von einzelnen im Wollmatinger Ried KN (D.Heinz, W.Mosbrugger & S.Werner<sup>1</sup>) und im Rheindelta (W.Leuthold, A.Schönenberger & J.Ulmer<sup>1</sup>), außerdem je 1 am 19.1.2001 an der Radolfzeller Aachmündung KN (S.Werner<sup>1</sup>) und am 16.9.2001 schwimmend (!) im Mindelsee KN (R.Schlenker). Je 1 rufend am 14.4., 15.4. und 28.4. aus dem Schilf am Donaualtwasser bei Unlingen BC sowie am 19.5. aus dem Schilfgürtel des Rohrsees RV, hier 1 auffliegend am 29.7.2001 (K.Bommer).

**Nachtreiber:** Außerhalb des Bodenseegebietes 1 vj. am 30.4.2001 am Donaunieder Stausee UL (T.Epple), 2 am 1.5.2001 an den Klärteichen Offenau HN (A.Riebold), 1 am 2.5.2001 am Schwarzen See RV (K.H.Siebenrock), 1 am 8.5. (G.Freundlieb), 1 ad. am 9.5. (R.Geier), 1 vj. am 15.5. (G.Freundlieb, U.Mahler, C.Walter) und 1 juv. am 16.7.2001 (R.Geier) in der Wagbachniederung KA/HD, 2 (1 ad., 1 vj.) am 25.5.2001 am Rohrsee RV (K.Bommer, A.Klein), 1 ad. am 26.5.2001 im Donaumoos UL/GZ (T.Epple, D.Kratzer, G.Nandi, S.Olschewski, A.Torkler), 1 vj. am 20.6.2001 an der Donau bei Ulm (M.Rau<sup>1</sup>), bis zu 3 (1 ad., 2 juv.) am 29.7.2001 an den Baggerseen Krauchenwies SIG (K.F.Gauggel), je 1 vom 5.-12.8.2001 an den Klärteichen Offenau HN (H.Furrington u.a.) und am 2.9.2001 im Rheindelta (C.Wagner\*).

**Kuhreiher\*:** 1 am 17.2.2001 bei Wyhlen LÖ (E.Gabler).

**Rallenreiher\*:** 3 am 1.5. (J.Vermehren\*), 2 am 13.5. (M.Hemprich & R.Pfüller<sup>2</sup>) und 1 am 8.6.2001 (E.Elmer<sup>2</sup>) im Rheindelta, außerdem 1 am 1.6.2001 rufend im Überflug über Meckenbeuren FN (M.Hemprich, A.Hemprich-Milow; M.Hemprich<sup>2</sup>).

**Seidenreiher:** Je 1 vom 27.1.-15.2.2001 bei Rheinweiler LÖ (D.Hoffmann) sowie am 26.4. (W.Zanola<sup>2</sup>), 5.5. und 28.5.2001 (J.Ulmer<sup>2</sup>) im Rheindelta, 1 am 21.4. ind 1-4 vom 26.7.-7.9.2001 bei Bremgarten FR (W.v.Eisengrein, H.Schwarz), je 2 am 6.5.2001 am Öpfinger Stausee UL (K.Anka u.a.), am 14.5.2001 am Baggersee Bühl TÜ (S.Berger & P.Ziemsen\*) und am 16.5.2001 im Wollmatinger Ried KN (S.Olschewski & S.Werner<sup>2</sup>), 1 am 27.5.2001 an der Radolfzeller Aachmündung KN (B.Porer<sup>2</sup>), 3 am 27.5. (I.Kling, U.Mahler, C.Walter) und 1 am 1.6.2001 (G.Göring) in der Wagbachniederung KA/HD, je 1 am 14.6.2001 im Langenauer Donaumoos UL (K.Moll, G.Nandi, H.Epple) und am 26.7.2001 bei Hartheim FR (R.Schneider, R.Stoll, K.Wäser), 2 am 9.8.2001 am Altheim Wyhlen LÖ (K.Kuhn), je 1 am 21.8. bei Fessenheim und bei Blodelsheim im Elsaß, 3 am 23.8. bei Blodelsheim und 1 am 29.8.2001 bei Grifflheim FR (J.u.R.Ruf).

**Silberreiher** (nur noch Beobachtungen von 3 und mehr Ind.): - *Oberrhein:* Max. 5 zwischen 21.10.2000 und 2.12.2001 bei Brühl HD (C.Stohl), je 3 am 20.1.2001 im Taubergießen OG (R.Birkenberger, J.Ruf, J.Rupp, F.Saumer), am 21.1.2001 bei Liedolsheim KA (G.Wörle), am 24.2. am Rußheimer Altheim KA und am 3.3.2001 bei Dettenheim KA (S.Dill) sowie vom 16.8.-3.9.2001 am Lampertheimer Altheim HP (N.Haass, H.Siegel, K.Kilian, S.Murray, S.Murray\*), u.a. 5 abends durchziehend am 4.10. und 3 vom 1.-2.11.2001 in der Wagbachniederung KA/HD (U.Mahler, C.Walter) und 4 am 26.11.2001 im Alten Kopfgrund bei Greffern RA (D.Koch\*). - *Bodensee:* Überwinterung von 20 am Untersee (z.B. max. 20 am 19.12.2000 und wieder 15 am 1.2.2001 bei Markelfingen KN; S.Olschewski, S.Schuster & S.Werner<sup>1</sup>), je 6 am 19.2. (H.u.O.Bihlmaier & M.Schmid\*) und am 25.2.2001 (I.Weiß\*) im Ermatinger Becken KN, 9 am 27.2.2001 bei Bohlingen KN (S.Werner<sup>1</sup>), bis zu 8 am 25.3.2001 im Wollmatinger Ried KN (B.Porer<sup>2</sup>), 8 am 13.4. (H.u.T.Epple, G.Nandi) sowie je 4 am 26.4. (W.Zanola<sup>2</sup>) und 4.5.2001 (A.Puchta<sup>2</sup>) im Rheindelta und 7 am 27.4.2001 im Eriskircher Ried FN (G.Knöttsch<sup>2</sup>). - *Donautal:* 7 am 9.1.2001 an der Gronne UL (K.Anka), am Öpfinger Stausee UL Maxima von 12 am 2.1., 14 am 4.1. und 16.1., 13 am 18.1., 23 am 21.1. und 8 am 26.2.2001 (K.Bommer, C.Haller, H.J.Rommel, K.Schilhansl, H.Stuiber), bei Daugendorf BC 3 am 9.1. (H.Eder), 5 am 5.3. und 3 am 17.3.2001 (K.Bommer), im Donaumoos UL 13 am 27.1. und 16 am 10.2. (K.Schilhansl), 19 am 11.2. (W.Lang\*), 11 am 25.2. (K.Schilhansl) und 8 am 17.3.2001 (S.Böhm\*), 18 am 15.2.2001 an den Kiesen Rißtissen UL (K.Anka), 10 am 26.2. und 9 am 17.3.2001 an den Fetzer Seen DLG (K.Schilhansl), 6 vom 6.-8.3.2001 bei Riedlingen BC (K.u.L.Braun), 5 am 10.3.2001 bei Riedheim GZ (K.Schilhansl), je 4 am 13.4.2001 an den Kiebingen Baggerseen TÜ (S.Berger & M.Gues\*) und am 24.3.2001 bei Unlingen BC (K.Bommer), dann wieder 3 am 11.9. an den Fetzer Seen DLG sowie 3 am 21.9. und 6 am 2.10.2001 am Schurrsee DLG (K.Schilhansl), 4 am 22.9. (K.Bommer), 11 am 10.10. (T.Epple) und 3 am 16.10.2001 (K.Schilhansl) am Öpfinger Stausee UL, 4 am 23.9., 5 am 29.9. und 20.10., 30 am 10.11. und 24 am 11.11. im Gundelfinger Moos DLG sowie 4 am 1.10. am Leipheimer Stausee GZ 2001 (K.Schilhansl, T.Epple, G.Nandi), am 25.11.2001 13 an den Kiesen Rißtissen UL (G.Nandi, J.Müller) und 52 (!) am Schurrsee DLG (T.Epple). - *Übriges Land:* 5 am 13.1.2001 am Aalkistensee PF (G.Vögele), 4 am 27.2.2001 bei Laupheim BC (W.Huber fide K.Bommer) und am 15.3.2001 an den Kiebingen Baggerseen TÜ (S.Berger\*), 3 am 15.7.2001 am Rohrsee RV (K.Bommer), 6 am 26.8. am Illerstausee Kardorf MN und 3 am 27.10.2001 am Wuhrmühleweiher RV (W.Einsiedler) und 5 am 14.10.2001 an den Baggerseen Krauchenwies SIG (K.F.Gauggel, J.Hauck, M.Sindt).

**Purpurereiher:** Neben einzelnen Beobachtungen am Bodensee je 1 schon am 15.3.2001 in der Wagbachniederung KA/HD (R.Geier), am 4.5. (G.Brenneisen, D.Niethammer, J.u.R.Ruf) und am 18.5.2001

(H.Schwarz) im Freiburger Rieselfeld, am 10.5.2001 am Baggersee Bühl (S.Berger & P.Ziemsens\*), am 11.5. (H.Müller) und 1.7.2001 (K.Anka) am Schmiechener See UL, am 12.5.2001 am Rußheimer Altrhein KA (J.Hönle), am 24.5.2001 an den Rümer Fischteichen NU (K.Schilhansl), vom 25.-27.5. (K.Bommer, A.Klein), am 28.7. und 11.8.2001 (WEinsiedler) am Rohrsee RV, am 17.6.2001 an den Sauldorfer Baggerseen SIG (K.F.Gauggel, J.Hauck, B.Pfaff, M.Sindt) sowie am 22.7. und 28.7.2001 (N.Iaass, H.Siegel) am Lamprather Altrhein HP, 7 kreisend und mit 3 Graureihern abziehend am 22.8., 9 noch am 9:9. und 4 kreisend mit 9 Graureihern am 17.9.2001 in der Wägbachniederung KA/HD (G.Freundlieb), 1 juv. am 11.9.2001 am Altrhein Kleiner Bodensee KA (F.Scholler) und 3 am 11.10.2001 am Lamprather Altrhein HP (W.Schumann).

**Schwarzstorch:** 1 am 27.2.2001 bei Rechtenstein UL (J.Günther), 2 am 17.3. auf einem Baum bei Heidelberg (fide C.Dietzen\*), je 1 am 17.3. bei Pföhren VS und am 18.3.2001 bei Daugendorf BC (J.Günther, B.Roth) sowie am 18.3. und 25.3.2001 bei Krauchenwies SIG (K.F.Gauggel, J.Hauck, Merz, M.Sindt), 5 am 18.3. (C.Dietzen\*) und 2 am 9.9.2001 (C.Walter) durchziehend über der Wägbachniederung KA/HD, 1 am 24.3.2001 bei Wernau ES (R.Kimpfler), 2 am 25.3.2001 bei Hohenstein RT (H.-M.Koch), je 1 am 25.3.2001 bei Schlatt GP (M.Nowak), am 26.3.2001 bei Donaueschingen VS (M.A.Neumann\*), am 29.3. (B.Keist\*) und 2.6.2001 (A.Schönenberger<sup>2</sup>) bei Lustenau/Schweiz, am 18.4.2001 bei Kleinkems LÖ (D.Kratzer) und bei Crailsheim SHA (K.Rögelein), 2 am 26.4.2001 bei Kleingartach HN (M.Meny), je 1 am 11.5.2001 über dem Großen Lautertal UL (K.Bommer), am 23.6.2001 bei Altann RV (E.Schaefer), am 10.8.2001 bei Breitenholz Tü (E.Krauß) und bei Maria Steinbach MN (WEinsiedler), am 12.8.2001 2 bei Öhringen KÜN (G.Unger) und 12 bei Pfullendorf SIG (K.F.Gauggel), am 18.8.2001 10 bei Breitenholz Tü (E.Krauß) und 1 beim Brielhof BL (Fide D.Schmidt), am 20.8.2001 1 juv. am Öpfinger Stausee UL und 2 bei Achstetten BC (T.Epple, G.Nandi), je 1 am 2.9.2001 bei Pfordorf Tü (M.Riesell, H.Stadelmaier) und am 11.9.2001 bei Vordersteinenberg WN (fide D.Schmidt), je 2 am 15.9.2001 südlich Waldshut (D.Kratzer) und am 17.9.2001 ziehend bei Winnenden WN (H.Schlüter\*), am 18.9.2001 2 über den Klärteichen Offenau HN (H.Furrington) und 5 bei Mittelstadt RT (G.u.R.Armbruster), je 2 am 21.9.2001 über dem Gundelfinger Moos DLG (K.Moll) und im Raum Platzhof KÜN (H.Häussler) sowie am 22.9.2001 im Osterried BC (K.Schilhansl) und 1 am 23.9.2001 über Neckartenzlingen ES (G.u.R.Armbruster).

**Weißstorch:** Bis zu 28 (am 13.1.2001, S.Schuster<sup>1</sup>) überwintert an einer Futterstelle bei Böhningen KN, 22 kreisend am 15.8.2001 über dem Heidelberger Zoo (F.Wissing\*), bis zu 65 am 20.8. und 63 am 21.8.2001 in den Elzweiesen EM/OG (J.Rupp).

**Zwergschwan:** 4 (2 ad., 2 juv.) am 13.11.2000 im Rheindelta einfliegend (P.Willi<sup>1</sup>) und hier noch am 9.1.2001 (V.Blum & E.Winter<sup>2</sup>).

**Singschwan:** 4 am 5.1. bei Tannheim BC (WEinsiedler), 10 (8 ad., 2 juv.) am 14.1.2001 bei Mothorn/Elsaß (E.Frey), 2 am 15.1. (K.Anka) und 4 am 10.2.2001 (M.Schmid\*) auf dem Öpfinger Stausee UL, 19 am 11.2.2001 im Langenauer Donaumoos UL (W.Lang\*; M.Rau\*) sowie 6 (2 ad., 4 vj.) am 26.2.2001 auf den Mooswaldseen GZ (K.Schilhansl), dann wieder 9 (6 ad., 3 juv.) am 27.10.2001 auf dem Peterswörther Stausee DLG (H.Bihlmaier, T.Epple, G.Nandi), 2 am 2.11.2001 bei Pleidelsheim LB (D.Skruzny) und 5 (2 ad., 3 juv.) am 17.11.2001 auf dem Leipheimer Stausee GZ (K.Schilhansl). Auf dem Bodensee im Ermatinger Becken KN 149 am 25.12. (B.Porer<sup>1</sup>) und 151 am 31.12.2000 (S.Trösch<sup>1</sup>), 202 (155 ad., 47 vj.) am 14.1. (M.Schneider-Jacoby<sup>1</sup>), 181 am 21.1. (M.Basen\*) und 197 (137 ad., 60 vj.) am 21.1.2001 (S.Werner<sup>1</sup>), im Rheindelta 48 am 28.12.2000 (W.Zanola<sup>1</sup>), 85 am 20./21.1. (D.Koch, C.Gönner, G.Juen, P.Mosimann-Kampe, S.Trösch u.a.\*) und 69 (43 ad., 26 vj.) am 19.2.2001 (P.Willi<sup>1</sup>), außerdem 21 am 6.1.2001 im Briskircher Ried FN (WEinsiedler) und 30 am 16.1.2001 bei Friedrichshafen (D.Koch\*).

**Kurzschnabelgans\*:** 1 am 5.5.2001 im Gundelfinger Moos DLG (K.Schilhansl).

**Weißwangengans\*:** 1 ad. (unberingt) am 16.1.2001 bei Friedrichshafen (D.Koch\*), je 1 am 7.2.2001 unter 95 Graugänsen bei Willstätt OG (G.Müller) und am 10.11.2001 auf den Vollmerseen GZ (T.Epple, G.Nandi).

**Rothalsgans:** Nachtrag: 3 vom 18.-20.11.2000 auf den Fetzer Seen DLG (W.Beissmann, S.Böhm, T.Epple, K.Schilhansl u.a.). 2 (evtl. Wildvögel) am 6.2.2001 bei Güttingen/Schweiz am Bodensee (OAG Bodensee<sup>2</sup>), je 1 a 27.5.2001 im Raminger Donaumoos UL (G.Nandi, A.Torkler) und vom 5.-7.10.2001 auf dem Illerstausee Kardorf MN (WEinsiedler).

**Knäkente:** 1,1 bereits am 18.2.2001 auf dem Bodensee bei Horn KN (J.Günther) und 0,1 noch am 24.11.2001 auf dem Roxheimer Altheim LU (V.Schmidt\*). 59 am 23.8.2001 auf den fetzer Seen DLG (T.Epple, G.Nandi).

**Blaufügelente\*:** Je 1,0 vom 20.-21.1. (C.Gönner, D.Heuschen, W.Mosbrugger & S.Olschewski<sup>1</sup>; D.Koch, G.Juen, P.Mosimann-Kampe, S.Trösch u.a.\*), am 18.2. (J.Ulmer<sup>1</sup>) und am 13.4.2001 (G.Juen, H.u.T.Epple, G.Nandi, J.Günther, B.Roth) im Rheindelta.

**Amazonasente\*:** 1 am 17.3.2001 in der Wägbachniederung KA/HD (C.Dietzen\*).

**Marmelente\*:** 0,1 am 28.9.2001 auf dem Illerstausee Kardorf MN (WEinsiedler).

**Kolbenente:** Auf dem Bodensee im Januar 2001 wieder Anstieg auf 10.654, fast alle auf dem Untersee, bis Mitte Februar nur noch 432 und Mitte März wieder 775 (OAG Bodensee<sup>1</sup>).

**Moorente:** Je 1 am 19.1.2001 auf dem Schloßgartenteich Karlsruhe (F.Scholler), am 19.4. und vom 28.-31.8.2001 auf dem Schurrsee DLG (T.Epple, K.Moll). Am Bodensee Übersommerung und Brutverdacht (OAG Bodensee<sup>3</sup>).

**Kleine Bergente\*:** 1,0 vom 17.-20.2.2001 bei Hunningue/Elsaß (E.Gabler).

**Eisente:** 0,1 am 1.12.2001 auf dem Bodensee vor Triboltingen/Schweiz (M.Basen\*).

**Trauerente:** 1 am 13.4.2001 im Rheindelta (B.Roth, J.Günther & G.Juen\*), 7 am 26.10.2001 auf dem Schurrsee DLG (K.Moll) und 1 juv. am 10.11.2001 auf dem Faiminger Stausee DLG (T.Epple, G.Nandi).

**Samtente:** Je 3 am 7.1.2001 bei Radolfzell KN (W.Fischer, J.Günther, C.Kiefer) und am 14.1.2001 auf dem Stau Krafft-Plobsheim/Elsaß (B.Disch, J.-P.Hiss, J.Rupp, J.Wiegand u.a.), 9 am 20./21.1.2001 im Rheindelta (D.Koch, C.Gönner, G.Juen, P.Mosimann-Kampe, S.Trösch u.a.\*), 6 am 21.1. auf dem Untersee KN und 5 am 28.1.2001 vor Kesswil/Schweiz (M.Basen\*), 6 am 27.2.2001 vor Hegne KN (C.J.u.J.Völlm) sowie je 0,1 vom 3.-18.3.2001 auf einem Baggersee bei Dettenheim KA (S.Dill) und am 18.3.2001 bei Weisweil EM (D.Kratzer), dann wieder 1 juv. vom 17.-18.11.2001 auf den Kiesen Rottenacker UL (K.Anka, T.Epple, G.Nandi, B.Roth).

**Büffelkopffente\*:** 1,0 vom 18.5.-24.8.2001 im Wollmatinger Ried KN (M.Basen, H.Fries, H.Jacoby, B.Porer u.a.<sup>2,3</sup>).

**Zwergsäger:** 0,1 am 12.6.2001 im Wollmatinger Ried KN (H.Fries).

**Schwarzkopfruderente\*:** Je 0,1 am 26.8.2001 auf dem Donaurieder Stausee UL (M.Rau, N.Röder u.a.) und am 27.10.2001 auf dem Faiminger Stausee DLG (T.Epple, G.Nandi, H.Bihlmaier).

**Wespenbussard:** Über der Wägbachniederung KA/HD 11 durchziehend (um 10<sup>30</sup>) am 6.9. (I.Kling) und 67 (davon 64 von 8<sup>45</sup>-10<sup>50</sup>) ziehend am 9.9. (U.Mahler), ebenfalls am 9.9.2001 (10<sup>45</sup>-11<sup>45</sup>) 50 ziehend über dem Weingartener Moor KA (J.Hönle & G.Macdonald\*), dann 12 (11<sup>00</sup>-16<sup>30</sup>) am 10.9. (J.Hönle\*) und 2 (11<sup>00</sup>) am 11.9.2001 (I.Kling) wiederum über der Wägbachniederung KA/HD, 52 ziehend am 14.9.2001 (15<sup>05</sup>-15<sup>15</sup>) über Neckartenzlingen ES (G.u.R.Armbruster), 53 ziehend am 15.9.2001 südlich Waldshut (D.Kratzer), 11 am 18.9. und 6 am 26.9.2001 über Winnenden WN (H.Schlüter\*) sowie 7 noch am 14.10.2001 ziehend bei Baden-Baden (E.Keber\*).

**Schwarzmilan:** 1 schon am 15.2.2001 im Donautal bei Ulm (K.Anka), 38 am 28.3.2001 im Wollmatinger Ried KN (H.Fries), 73 am 19.6.2001 auf einem Hochspannungsmast bei Ubstadt KA

(S.Dill), 20 am 17.7.2001 bei Obereisesheim HN (H.Furringzon, W.Ende, W.Hellwig), je 28 am 28.7.2001 ziehend bei Tübingen (P.Forster\*) und am 8.8.2001 bei Weil der Stadt BB (K.Schüle) sowie 102 (!) durchziehend am 15.9.2001 südlich Waldshut (D.Kratzer).

**Rotmilan:** 9 am 28.1.2001 Konstanz KN (H.Fries), außerdem 27 am 20.9.2001 bei Altbierlingen UL (G.Nandi).

**Secadler:** Je 1 ad. am 10.2.2001 am Faiminger Donaustausee DLG (M.Rau\*) und vom 18.2.-13.3.2001 im Taubergießen bei Kappel OG (H.D.Welz, M.u.W.Jansen) sowie 1 vom 17.-18.2.2001 bei Kalden MN (W.Einsiedler).

**Rohrweihe:** 1,0 immat. noch am 27.12.2000 bei Moos KN (S.Schuster<sup>1</sup>), 29 durchziehend am 15.9.2001 südlich Waldshut (D.Kratzer) und 13 (2,7 und 4 juv.) durchziehend am 18.9.2001 (10<sup>30</sup>-13<sup>00</sup>) am Rohrsee RV (K.Bommer).

**Kornweihe:** Neben Beobachtungen von einzelnen bis wenigen Ind. 2,3 am 14.2.2001 im Langenauer Donaumoos UL (J.Hölzinger).

**Stuppenweihe\*:** Je 0,1 ad. vom 20.-23.4. bei Bohlingen KN und am 5.5.2001 im Wollmatinger Ried KN (OAG Bodensee<sup>2</sup>).

**Schlangenadler\*:** 1 vom 20.-27.5.2001 am Schliffkopf FDS (M.u.L.Förschler, W.Finkbeiner & R.Schlegel<sup>6</sup>).

**Mäusebussard:** 104 am 17.3. (in einer Stunde) und am 18.3.2001 erneut 103 durchziehend über der Wagbachniederung KA/HD (C.Dietzen\*).

**Rauhfußbussard\*:** Je 1 am 23.4.2001 bei Wangen RV (K.H.Siebenrock) und am 20.10.2001 bei Asbach MOS (C.Lunczer\*).

**Adlerbussard\*:** Je 1 am 11.5.2001 bei Karlsruhe (G.Müller, F.Scholler) und kreisend am 27.5.2001 bei Langenau UL (A.Torkler & U.Pittius<sup>6</sup>).

**Schelladler\*:** 2 durchziehende ad. am 18.3.2001 über den Baggerseen Krauchenwies SIG (K.F.Gauggel, J.Hauck, G.u.G.Merz), 1 juv./immat. am 27.3.2001 am Schmiechener See UL (J.u.H.Müller; Belegfotos!) und 1 wohl ad. am 25.4.2001 bei Kusterdingen Tü (M.Gschweng<sup>5</sup>).

**Schreiadler\*:** 1 ad. am 28.4.2001 über den Wernauer Baggerseen ES (W.Schmid\*) und 1 juv. durchziehend am 16.9.2001 im Rheindelta (K.Schilhansl u.a.).

**Steinadler:** 1 immat. vom 26.-27.4.2001 im Rheindelta (J.Ulmer<sup>2,3</sup>).

**Zwergadler\*:** 1 der hellen Morphe am 15.5.2001 bei Sasbach OG (M.Schilz<sup>6</sup>), 1 der dunklen Morphe (bzw. intermediär) am 16.9.2001 über dem Schurrsee DLG (T.Epple, C.Pielsticker) und 1 der dunklen Morphe am 3.10.2001 über dem Föhrenried RV (R.Wirth).

**Fischadler:** 1 am 6.1.2001 in der Fritschlach bei Karlsruhe (Weick fide E.Frey). 7 durchziehend am 15.9.2001 südlich Waldshut (D.Kratzer).

**Rotfußfalke:** 0,1 immat. am 11.4.2001 bei Tübingen (M.Süsser\*), je 1,0 ad. vom 4.-5.5.2001 im Wollmatinger Ried KN (M.Basen<sup>6\*</sup>), vom 19.-20.5. (U.Mahler) und am 2.10.2001 (R.Geier) in der Wagbachniederung KA/HD.

**Würgfalke\*:** 1 am 27.8.2001 bei Griesingen UL (T.Epple).

**Baumfalke:** 1 bereits am 8.4.2001 bei Möggingen KN (R.Schlenker).

**Haselhuhn:** Je 1 am 2.8. beim Wilden See FDS und am 12.10. sowie 1,0 abfliegend am 15.10.2001 bei Gengenbach OG (T.Ullrich).

**Wachtel:** 1 noch am 9.12.2000 im Bodenseegebiet bei Triboltingen/Schweiz (I.Weiß<sup>3</sup>).

**Tüpfelsumpfhuhn:** Je 1 am 31.3.2001 am Federsee BC (E.Kirsinger, R.Kühnle), am 9.7. (U.Mahler) und am 28.8. (T.Grziak) sowie vom 4.10.-3.11.2001 (C.Dietzen, G.Freundlieb, R.Geier, C.Walter) in der Wagbachniederung KA, am 13.8. im Rheindelta und am 23.8.2001 am Schurrsee DLG (W.Einsiedler), am 23.8., 3.10. und 7.10.2001 an den Baggerseen Krauchenwies SIG (K.F.Gauggel),

am 30.8.2001 in den Stebbacher Wiesen HN (M.Wieland) und vom 6.-11.9.2001 am Schmiechener See (G.u.R.Armbruster, H.u.T.Epple, G.Nandi) sowie mind. 4 am 2.9.2001 im Rheindelta (C.Wagner\*). **Kleines Sumpfhuhn\***: 0,1 am 10.5.2001 im Bündtlisried KN (S.Schuster<sup>2</sup>), je 1,0 rufend am 2.6. und 10.6.2001 am Rußheimer Altrhein KA (an zwei verschiedenen Stellen, S.Dill).

**Kranich**: 9 noch am 24.12.2000 ziehend bei Wangen KN (U.v.Wicht<sup>1</sup>). 1 juv. am 14.1.2001 bei Wörth GER (K.Bögelspacher\*), 2 am 20.1.2001 über dem Taubergießen OG (H.-D.Weber), 6 am 17.2.2001 ziehend bei Baienfurt RV (K.Wirth<sup>2</sup>), am 26.2.2001 8 ziehend über dem Federsee BC (J.Günther) und 1 am Öpfinger Stausee UL (K.Bommer), 2 am 14.3.2001 über Mahlberg OG (H.D.Welz), 7 am 17.3.2001 bei Heidelberg (C.Dietzen\*), 4 am 23.3.2001 über Dossenheim HD (M.Wink\*), 3 am 25.3.2001 über dem Wollmatinger Ried KN (B.Porer<sup>2</sup>) und 1 am 1.4.2001 am Lampertheimer Altrhein HP (M.Wink\*). Dann wieder 1 ad. vom 8.8.-9.10.2001 im Gundelfinger Moos DLG (K.Anka, H.Böck, S.Böhm, H.u.T.Epple, U.Mäck, K.Moll, K.Schilhansl u.a.), 13 am 18.9.2001 über Bissingen LB und 73 am 2.11.2001 über Bietigheim LB (D.Knöpfler\*), mind. 30 am 28.10.2001 über Zwiefalten RT (K.u.L.Braun) und abends ziehend über Dossenheim HD am 5.11.2001 (M.Wink\*). Nachtrag: Am 15.10.2000 83 ziehend über dem Tuniberg FR und ein weiterer Trupp im Hochnebel über Tiengen FR (F.Bergmann).

**Austernfischer**: 2 am 22.2.2001 am Rheinstau Freistett OG (A.u.E.Buchel\*) und 1 am 20.5.2001 im Wollmatinger Ried KN (R.Schlenker; D.Heuschen<sup>2</sup>).

**Stelzenläufer**: Je 1 am 16.5.2001 im Wollmatinger Ried KN (S.Kraft, F.Schmidt, J.Stahr & J.Willmann<sup>2</sup>), vom 19.-30.5.2001 im Langenauer Donaumoos UL (H.u.T.Epple, D.Kratzer, K.Moll, G.Nandi, S.Olschewski, K.Schilhansl, A.Torkler u.a.), am 20.5.2001 an den Baggerseen Krauchenwies SIG (K.F.Gauggel) sowie vom 20.-21.8. (H.u.T.Epple, G.Nandi) und am 19.8.2001 (K.Bommer) an den Kieseen Rißtissen UL.

**Säbelschnäbler**: Je 1 am 24.3. und 12.6. sowie vom 27.-28.6.2001 an den Baggerseen Krauchenwies SIG (K.F.Gauggel, A.Bauernfeind), am 9.4.2001 in der Konstanzer Bucht schwimmend (B.Porer<sup>2</sup>) und am 13.4. und 28.4.2001 im Rheindelta (S.Trösch & J.Ulmer<sup>2</sup>), 2 am 14.6.2001 an den Klärteichen Offenau HN (H.Furrington, K.Endmann, M.Wieland) und 1 vom 22.6.-17.7.2001 an den Kieseen Rißtissen UL (K.Anka, G.u.R.Armbruster, G.Nandi, K.Schilhansl u.a.).

**Seeregenpfeifer\***: 1,0 vom 27.-30.4.2001 im Rheindelta (A.Täschler, S.Trösch & J.Ulmer<sup>2</sup>; J.Vermehren\*).

**Mornellregenpfeifer**: 1 am 6.9.2001 im Rheindelta (R.Ertel, G.Juen u.a.<sup>8</sup>).

**Kiebitzregenpfeifer**: Je 1 vom 30.4.-2.5.2001 im Langenauer Donaumoos UL (K.Anka, H.u.T.Epple, J.Müller, G.Nandi, K.Schilhansl u.a.), vom 9.-13.5.2001 am Schurrsee DLG (K.Moll, H.Epple, G.Nandi), am 24.5.2001 an den Klärteichen Offenau HN (H.Becktle, K.Endmann), am 4.8.2001 morgens durchziehend über dem Federsee BC (J.Günther\*), am 10.8.2001 an den Fetzer Seen DLG (H.u.T.Epple), am 10.8. (ad.) und vom 7.-28.10. (juv.) am Illerstausee Kardorf MN sowie 2 ad. am 13.8.2001 im Rheindelta (W.Einsiedler), 1 ad. am 7.9. (T.Epple, G.Nandi, K.Moll, J.Müller) und 2 juv. am 22.9.2001 (K.Moll) am Schurrsee DLG und 1 am 25.9.2001 durchziehend in der Wagbachniederung KA/HD (U.Mahler).

**Goldregenpfeifer**: 1 am 2.2.2001 bei Kiebingen Tü (J.Günther), 5 am 14.2.2001 im Langenauer Donaumoos UL (J.Hölzinger), 6 am 25.2.2001 bei Rust OG (J.Rupp), 1 am 4.3.2001 in den Pfäffinger Wiesen Tü (J.Günther, C.Kiefer), 4 am 8.3.2001 im Gundelfinger Moos DLG (K.Anka), je 1 am 9.3.2001 bei Berkheim BC (W.Einsiedler), vom 28.-31.8.2001 an den Fetzer Seen DLG (K.Moll, T.Epple, G.Nandi), am 22.9.2001 an den Kieseen Rißtissen UL (K.Bommer), am 6.10.2001 bei Winnenden WN (H.Schlüter\*) und am 10.10.2001 bei Affalterbach WN (H.Schlüter\*).

**Stuppenkiebitz\***: 1 ad. am 11.3.2001 im Illertal bei Dettingen BC (K.Bommer).

**Kiebitz:** 3.482 am 25.2.2001 im Donaumoos UL (H.J.Eder, J.Günther, B.Roth).

**Knutt:** Je 1 am 30.8.2001 in den Stebbacher Wiesen HN (M.Wieland) und vom 31.8.-7.9.2001 in der Wagbachniederung KA/HD (S.Dill, G.Freundlich, I.Kling, U.Mahler, F.Scholler, C.Walter u.a.; J.Weiß & D.Heilig\*), vom 3.-4.9.2001 bei Breisach FR (W.v.Eisengrein, H.Schwarz) und am 8.9.2001 am Baggersee Dintenhofen UL (G.u.R.Armbruster), 2 juv. vom 9.-15.9.2001 an den Kiesecken Rottenacker UL (H.u.T.Epple, J.Müller, G.Nandi, C.Pielsticker) und 1-3 juv. vom 13.-22.9.2001 am Schurrsee DLG (K.Moll, T.Epple, C.Pielsticker, K.Schilhansl).

**Sanderling:** 1 noch am 16.12.2000 im Rheindelta (W.Zanola<sup>1</sup>). Dann wieder 1 am 5.5.2001 im Sontheimer Moos UL (H.u.K.Bihlmaier, M.Schmid), 1-2 vom 14.-16.5.2001 an den Kiesecken Rißtissen UL (H.u.T.Epple, K.Schilhansl), je 1 am 19.5.2001 an den Mooswaldseen GZ (H.u.T.Epple, G.Nandi), am 22.5. im Langenauer Donaumoos UL und am 26.5.2001 am Schurrsee DLG (K.Moll), bis zu 8 am 3.6. (S.Trösch<sup>2</sup>), 10 am 2.9. (C.Wagner\*), 8 am 15.9. (T.Epple, J.Müller, G.Nandi, C.Pielsticker), 10 am 16.9. (K.Schilhansl u.a.) sowie 4 juv. am 22.9.2001 (W.Einsiedler) im Rheindelta sowie je 1 am 9.9.2001 an den Kiesecken Rißtissen UL (G.Nandi) und am 21.8.2001 in der Wagbachniederung KA/HD (I.Kling).

**Zwergstrandläufer:** 1 erfolgreich überwintert vom 16.12.2000-6.3.2001 im Rheindelta (W.Leuthold, S.Olschewski, S.Trösch, J.Ulmer, W.Zanola u.a.<sup>1</sup>; D.Koch, C.Gönner, G.Juen, P.Mosimann-Kampe u.a.\*). Außerdem 2 schon am 19.3.2001 bei Bechingen BC (J.Günther, B.Roth).

**Graubruststrandläufer\*:** 1 am 30.8.2001 am Illerstausee Kardorf MN (W.Einsiedler<sup>2</sup>).

**Sichelstrandläufer:** 1 am 2.5.2001 im Langenauer Donaumoos UL (H.u.T.Epple, K.Schilhansl), 2 am 16.5.2001 an den Kiesecken Rißtissen UL (H.Epple, K.Schilhansl), 4 am 17.5. und 6 am 18.5.2001 Rohrsee RV (W.Einsiedler, E.Schaefer), 2 am 18.5.2001 an den Baggerseen Krauchenwies SIG (K.F.Gauggel), 3 am 19.5.2001 am Rohrsee RV (K.Bommer), 2 am 27.5.2001 am Schurrsee DLG (D.Kratzer, G.Nandi, U.Pitius, A.Torkler), 1 am 28.5.2001 bei Steinbach MN (W.Einsiedler) und 4 vom 15.-17.6.2001 an den Baggerseen Krauchenwies SIG (K.F.Gauggel).

**Meerstrandläufer\*:** Je 1 am 6.5.2001 im Wollmatinger Ried KN (nähere Angaben fehlen, OAG Bodensee<sup>2</sup>) und am 8.6.2001 im Rheindelta (E.Elmer<sup>2</sup>).

**Kampfläufer:** 2 überwintern vom 31.12.2000-27.2.2001 im Ermatinger Becken KN (H.Jacoby, W.Mosbrugger, S.Trösch u.a.<sup>1</sup>).

**Zwergschnepfe:** 1 überwintert vom 18.11.2000-3.3.2001 bei Donzdorf GP (M.Nowak), je 1 am 26.1.2001 bei Rothtal MN (W.Einsiedler) und am 1.4.2001 am Rössler Weiher RV (K.Wirth), 1-2 vom 7.-26.4.2001 am Ebenweiler Weiher RV (R.Ortlieb, R.Prinzinger) und 1 am 2.11.2001 in der Wagbachniederung KA/HD (U.Mahler). Im Bodenseegebiet 8 vom 21.11.-8.12. bei Wolfurth/Schweiz, wo wohl 1-2 erfolgreich überwintert haben (15.1.-17.2.2001), und 13 am 3.12.2000 bei Lustenau/Schweiz (A.Schönenberger<sup>1</sup>).

**Doppelschnepfe\*:** Je 1 am 26.5.2001 im Donaumoos bei Rammingen UL (K.Schilhansl, G.u.R.Armbruster, H.Epple) und am 28.9.2001 bei Illertissen/Bayern (J.Schlögel<sup>2</sup>).

**Pfuhlschnepfe:** 1 vom 24.2.-4.3.2001 im Ermatinger Becken KN (D.Heinz, H.Jacoby & I.Weiß<sup>2</sup>), 5 am 19.4.2001 im Gundelfinger Moos DLG (K.Moll), je am 1.7.2001 am Rohrsee RV (E.Huber), am 2.9.2001 im Rheindelta (C.Wagner\*) und vom 3.-7.9. und 18.9.2001 am Schurrsee DLG (K.Anka, K.Moll, H.u.T.Epple, J.Müller, G.Nandi, K.Schilhansl).

**Großer Brachvogel:** Am Bodensee erbrachten Simultanzählungen zwischen 26.11.2000 und 25.3.2001 max. 1330 am 28.1. und 18.3.2001 (OAG Bodensee<sup>1</sup>). Außerdem 9 am 4.1.2001 bei Bettighofen UL (K.Bommer), 6 am 21.1.2001 am Öpfinger Stausee UL (K.Schilhansl) und max. 70 am 23.8. (K.Moll, K.Schilhansl, H.Böck, H.u.T.Epple, G.Nandi) und 55 am 3.9.2001 (K.Anka) am Schurrsee DLG.

**Regenbrachvogel:** Abseits des Bodensees 1-2 vom 4.-11.4.2001 bei Rust OG (J.Rupp), 3 am 20. und 23.4.2001 im Gundelfinger Moos DLG (K.Moll, T.Epple, G.Nandi), 5 am 29.4. (S.Böhm & M.Sailer\*) und 4 am 30.4.2001 (WEinsiedler) an den Fetzer See DLG, 2 am 5.5.2001 im Sontheimer Moos UL (H.u.K.Bihlmaier, M.Schmid), 10 (8 im Trupp) am 6.5.2001 in der Wägbachniederung KA/HD (B.Disch, W.Finkbeiner), je 1 vom 1.-3.7.2001 am Schurrsee DLG (K.Moll, K.Schilhansl) und vom 24.7.-3.8.2001 in der Saalbachniederung KA (F.Debatin, R.Geier), „mehrere“ am 29.7.2001 (und schon einige Tage zuvor) bei Riedlingen BC (T.Stadtlander), 3 am 17.8.2001 an den Fetzer Seen DLG (K.Moll, G.Nandi, T.Epple) und 1 am 8.9.2001 am Öpfinger Stausee UL (K.Bommer, C.Moning, C.Wagner).

**Dunkelwasserläufer:** 20 am 28.4.2001 im Langenauer Donaumoos UL (K.Anka, K.Moll, K.Schilhansl).

**Grünschenkel:** Je 1 am 28.1. und 10.2.2001 bei Arbon/Schweiz (S.Trösch<sup>1</sup>) sowie am 11.2.2001 im Ermatinger Becken KN (P.A.u.B.Brändli\*), außerdem max. 51 (!) am 28.4. und 48 am 29.4.2001 im Langenauer Donaumoos UL (K.Anka, K.Moll, K.Schilhansl), am 29.4.2001 zudem noch 22 im Ramminger Moos UL (K.Schilhansl) und 19 am 4.8.2001 morgens durchziehend über dem Federsee BC (J.Günther\*).

**Teichwasserläufer:** Je 1 am 26.4.2001 am Dellmensinger Stausee UL (K.Anka, H.u.T.Epple, G.Nandi) und vom 26.-28.4.2001 im Wollmatinger Ried KN (B.Porer & S.Werner<sup>2</sup>).

**Bruchwasserläufer:** 1 schon am 17.3.2001 Neudingen VS (J.Günther) und max. 50 am 6.5. (K.Anka) und 8.5. sowie 55 am 16.7.2001 (K.Schilhansl) im Langenauer Donaumoos UL.

**Flußuferläufer:** 1 überwintert vom 17.12.2000-6.2.2001 in Bad Cannstatt S (M.Schmolz).

**Steinwälzer:** Je 1 am 2.5. (H.Fries) und 4.5.2001 (M.Basen\*) im Wollmatinger Ried KN, am 9.5.2001 bei Hagenbach GER (U.Janz\*) und am 2.9.2001 am Öpfinger Stausee UL (K.Bommer), je 1 juv. am 12.9.2001 in der Wägbachniederung KA/HD (A.Gutting & S.Murray\*) und am 2.9.2001 im Rheindelta (C.Wagner\*), 2 juv. am 6.9.2001 bei Konstanz (M.Basen\*), je 1 am 9.9.2001 bei Rottenacker UL (J.Müller, K.Köbele u.a.) und am 21.9.2001 am Illerstausee Kardorf MN (WEinsiedler).

**Odinshühnchen\*:** 1 juv. vom 6.-10.9.2001 auf dem Schmiechener See UL (K.Anka, G.u.R.Armbruster, H.u.T.Epple, J.Müller, G.Nandi u.a.).

**Thorshühnchen\*:** Nachtrag: 1 am 27.11.2000 bei Arbon/Schweiz (OAG Bodensee<sup>1</sup>).

**Schmarotzerraubmöwe\*:** 1 am 2.2.2001 an der Mettnau KN (S.Werner<sup>1</sup>).

**Skua\*:** 1 am 11.9.2001 über dem Bodensee-Obersee vor Friedrichshafen (D.Kratzer).

**Schwalbenmöwe\*:** 1 ad. vom 1.-14.9.2001 auf dem Öpfinger Stausee UL (K.Bommer, K.Anka, G.Nandi, H.u.T.Epple, D.u.R.Kratzer, K.Schilhansl, G.u.R.Armbruster, F.Guter, K.Moll, M.Rau, J.Müller, G.Juen, R.Teetz, M.Schmid, O.Graf, G.Freundlieb u.v.a.).

**Zwergmöwe:** Erstmals Überwinterung auf dem Bodensee: 12 am 16.12.2000 im Rheindelta (P.Mosimann & S.Trösch<sup>1</sup>), auf dem Untersee 5 am 19.12., 10 am 28.12.2000, 5-6 im Januar und 5 vj. am 2.2.2001 (S.Schuster & S.Werner<sup>1</sup>), auf dem Obersee 4 am 17.12.2000 (P.Mosimann & S.Trösch<sup>1</sup>) und 1-2 zwischen 5.1. (P.Lustenberger<sup>1</sup>) und 5.3. (P.Willi<sup>1</sup>), aber 4 am 28.2.2001 (S.Schuster<sup>1</sup>). Am 25.11.2001 4 auf den Mooswaldseen GZ und 1 auf den Faiminger Stausee DLG (T.Epple) sowie 1 noch am 1.12.2001 auf dem Roxheimer Silbersee LU (V.Schmidt\*).

**Dünnschnabelmöwe\*:** 11 ad. am 13.5. im Wollmatinger Ried KN und 2 ad. am 14.5.2001 in der Konstanzer Bucht (B.Porer<sup>2</sup>), 1 ad. vom 13.-18.5.2001 an der Bregenzer Aachmündung/Bodensee (V.Blum, S.Olschewski, S.Schuster, J.Ulmer & E.Winter<sup>2</sup>) und 2 ad. vom 17.-18.5.2001 im Rheindelta (J.Ulmer<sup>2</sup>).

**Dreizehenmöwe:** 1 vj. am 21.1.2001 im Ermatinger Becken KN (S.Werner<sup>1</sup>).

**Raubseeschwalbe:** Je 1 am 16.4.2001 bei Kleinkems LÖ (D.Kratzer), im Rheindelta am 13.4. (H.u.T.Epple, G.Nandi), am 19.4. (A.Puchta<sup>2</sup>), 28.4., 3.5. und 5.5.2001 (J.Ulmer<sup>2</sup>), am 26.4., 7.5. und 9.5.2001 an der Bregenzer Aachmündung/Bodensee (V.Blum & E.Winter<sup>2</sup>), 1 ad. am 14.8.2001 am Altrhein Wyhlen LÖ (Ju.K.Kuhn, B.Sättele), 2 am 2.9. (C.Wagner\*), 5 a 15.9. (T.Epple, J.Müller, G.Nandi, C.Pielsticker) und 4 am 16.9.2001 (K.Schilhansl) im Rheindelta.

**Brandseeschwalbe:** 1 am 9.6.2001 im Rheindelta (A.Schönenberger<sup>2</sup>) und 4 am 16.9.2001 auf dem Untersee KKN (M.Basen, D.Heinz & H.Werner\*).

**Küstenseeschwalbe\*:** Je 1 am 28.4. und 17.5.2001 im Rheindelta (J.Ulmer<sup>2</sup>), 2 am 13.5.2001 im Ermatinger Becken KN (S.Werner<sup>2</sup>) und 1 am 30.6.2001 am Illerstausee Kardorf MN (W.Einsiedler).

**Zwergseeschwalbe:** Je 1 ad. am 24.5. (J.Ulmer<sup>2</sup>) und 26.5.2001 (A.Schönenberger<sup>2</sup>) im Rheindelta, am 20.6.2001 im Wollmatinger Ried KN (G.Maurer<sup>2</sup>) und am 4.8.2001 auf dem Federsee BC (J.Günther\*).

**Weißbartseeschwalbe:** Im Rheindelta 3 schon am 12.4. (S.Trösch<sup>2</sup>), je 1 am 13.4. (B.Roth, J.Günther & G.Juen\*) und bis 8 am 17.5.2001 (J.Ulmer<sup>2</sup>), 3 vom 28.-29.4.2001 in der Wägbachniederung KA/HD (M.Fehlow, N.Haass, C.Walter), im Ermatinger Becken KN 1 am 3.5. (M.Basen<sup>2</sup>), 2 am 9.5. (I.Weiß<sup>2</sup>), 3 am 11.5. (S.Trösch<sup>2</sup>) und 4 am 13.5.2001 (S.Werner<sup>2</sup>), je 1 am 9.5.2001 bei Hagenbach GER (U.Janz\*) und am 11.5.2001 an den Kiesseen Rißtissen UL (G.Nandi), 2 am 13.5.2001 an den Laupheimer Kiesseen BC (H.Epple, G.Nandi, K.Schilhansl), 3-6 vom 17.-19.5.2001 an den Mooswaldseen GZ (H.u.T.Epple, G.Nandi, K.Schilhansl), 1 am 25.5.2001 am Illerstausee Kardorf MN (W.Einsiedler) und 8 am 29.5.2001 an den Baggerseen Krauchenwies SIG (K.F.Gauggel).

**Trauerseeschwalbe:** 1 bereits am 25.3.2001 am Rohrsee RV (R.Kühnle).

**Weißflügelseeschwalbe:** 1 am 1.5.2001 im Rheindelta (S.Trösch<sup>2</sup>), 1 am 1.5. und 4 am 2.5.2001 am Rohrsee RV (K.Bommer, W.Einsiedler), bis zu 4 am 4.5.2001 im Ermatinger Becken KN (B.Porer<sup>2</sup>), 4 am 6.5.2001 am Häcklerweiher RV (R.Wirth), 1 am 8.5. (G.Freundlieb, C.Walter) und 2 am 9.5.2001 (M.Riffel, F.Staab, C.Dietzen, V.Schmidt, C.Walter) in der Wägbachniederung KA/HD, außerdem je 1 juv. am 4.8.2001 auf dem Federsee BC (J.Günther\*) und am 22.9.2001\* am Rohrsee RV (K.Bommer).

**Sumpfohreule:** 2 am 6.4.2001 bei Salem FN (D.Koch\*), je 1 am 28.4.2001 im Weitenried KN (S.Olschewski<sup>2</sup>), am 28.4. (L.Nienhaus, K.Roth u.a.\*) und 6.5.2001 (M.Schleicher<sup>2</sup>) im Rheindelta sowie 1 am 28.10.2001 im Langenauer Donaumoos UL (G.Frommer).

**Alpensegler:** Am 31.3.2001 5 über Weil LÖ (J.Schwarz\*) und 7 über Efringen-Kirchen LÖ (D.Kratzer), je 1 am 11.4.2001 über der Wägbachniederung KA/HD (M.Wink\*), am 13.4. (K.Büchle<sup>2</sup>) und 28.4.2001 (H.Schlüter<sup>2</sup>) im Raum Konstanz, am 4.8.2001 über Tuttlingen (J.Günther\*) und am 2.9.2001 über dem Rheindelta (C.Wagner\*), 47 am 15.9. und 105 am 21.9.2001 durchziehend südlich Waldshut (D.Kratzer) und 1 am 29.9.2001 im Federseeried BC (K.F.Gauggel, D.Haas).

**Mauersegler:** Erstbeobachtungen am 16.4. (1) in der Wägbachniederung KA/HD (M.Wink\*) und am 18.4.2001 im Rheindelta (C.Meier-Zwicky<sup>2</sup>).

**Bienenfresser:** 12-15 am 1.5.2001 bei Spiegelberg WN (G.Götz; J.Stober\*), 6 vom 15.-16.5.2001 bei Heilbronn (H.Badtke, W.Ende, H.Furrington, H.Hartmann, M.Wieland), je 1 am 20.5.2001 bei Knittlingen PF (K.Gogel) und am 25.6.2001 über Überlingen FN (D.Koch<sup>2</sup>), 40 am 1.8.2001 bei Ettenheim OG (G.Beile, H.Gorny, A.Rohrbeck), 12 am 11.8.2001 bei untergruppenbach HN (P.Schmidt), 1 am 18.8.2001 bei Pfahlbronn WN (A.Sombrutzki), 20 am 10.9.2001 bei Heilbronn (P.Schmidt), 45 am 22.9.2001 bei Waltershofen FR im Schwarm nach Süden abziehend (J.Herr, G.Holzwarth, D.Niethammer, W.Oberle, J.Ruf, F.Strauß) und 60 am 24.9.2001 in Aalen AA (R.Bretzger).

**Blauracke\*:** 1 am 12.5.2001 bei Rielsingingen KN (S.Werner\*).

**Wiedehopf:** 1 schon am 18.3.2001 bei Krafft/Elsaß (B.Disch, J.Wiegand).

**Weißbrückenspecht\***: 0,1 am 1.4.2001 bei Weingarten RV (H.Kapler).

**Felsenschwalbe**: 1 am 13.4.2001 im Rheindelta (H.u.T.Epple, G.Nandi).

**Rötelschwalbe\***: Je 1 am 16.4.2001 am Ortsrand von Eriskirch FN mit 3 Rauchschnalben (W.Frenz & G.Knötzsch<sup>2</sup>) und am 21.4.2001 unter 800 Rauchschnalben in Nürtingen ES (J.Günther\*).

**Rotkehlpieper**: 4 am 4.5. (A.Puchta<sup>2</sup>) und 1 ziehend am 7.5.2001 (A.Täschler<sup>2</sup>) im Rheindelta, ebenso 4 am 5.5. und 1 am 10.5.2001 im Wöllmatinger Ried KN (I.Weiß<sup>2</sup>), je 1 am 11.5.2001 bei Ribtissen UL (G.Nandi), am 13.5. und 17.5.2001 im Langenauer Donaumoos UL (K.Schilhansl) und am 14.5.2001 bei Mittelstadt RT (R.Armbruster).

**Schafstelze**: *M.f.flavissima\**: 3,0 am 28.8. und 2,0 am 1.9.2001 in der Wagbachniederung KA/HD (S.Dill, T.u.W.Lang). *M.f.feldegg\**: 1,0 am 30.4.2001 im Gundelfinger Moos DLG (WEinsiedler), 1,2 am 8.5.2001 bei Crailsheim SHA (K.Rögelein) und 1,0 am 8.6.2001 im Rheindelta (M.Basen & S.Werner\*).

**Zitronenstelze\***: 1,0 am 1.5.2001 in der Wagbachniederung KA/HD (M.Schulz, U.Roosen).

**Bachstelze**: *Motacilla alba yarrellii\**: 1,1 am 7.4. und noch 1 am 11.4.2001 bei Gingen GP (W.Lissak, M.Nowak).

**Seidenschwanz**: 14 am 30.3.2001 bei Donzdorf GP (M.Nowak), 2 Trupps von 30-32 und 7-8 am 30.3. (J.Hönle\*) sowie 15 vom 31.3.-1.4.2001 im Weingartener Moor KA (C.Dietzen, V.Schmidt, C.Stohl) im Weingartener Moor KA, 10 am 2.4. und mind. 55 am 22.4.2001 in Winnenden WN (H.Schlüter\*), am 4.4.2001 25 bei Pfahlheim AA (P.John), 7 im Schwenninger Moos VS (M.A.Neumann\*) und 37 in Attenhofen NU (K.Schilhansl), am 6.4.2001 26 im Taubergießen OG (D.Kratzer, F.Straub) und 21 in Bopfingen AA (D.Stahl\*), 2 am 8.4.2001 bei Ottenbach GP (W.Lang\*), 17 am 11.4.2001 bei Albstadt BL (M.Handschuh), 25 am 11.4. und 1 noch am 26.4.2001 in Geislingen GP (H.Rockenbauch), max. 120 zwischen 11. und 15.4.2001 in Öhringen KÜN (W.Gräf, A.Nodes), 22 am 12.4.2001 in Lauchheim AA (E.Thielscher\*), am 13.4.2001 20-30 am Breitenauer See HN (H.Häussler) und 30 in Göggingen UL (K.Anka), 104 am 14.4. und 11 am 22.4.2001 am Breitenauer See (H.Furrington, M.Wieland), max. 191 zwischen 14.4. und 27.4.2001 am Breitenauer See HN (G.Adam, K.Endmann, H.Furrington, F.Pirrot, C.u.M.Wieland u.a.), 85 am 15.4.2001 bei Weinsbach KÜN (G.Unger), 15 am 21.4. und 100 am 1.5.2001 in Mössingen TÜ (M.Riebesell, H.Stadelmaier, G.Steinbrinck), am 24.4.2001 15 in Leipheim GZ (K.Moll) und mind. 25 bei Walldorf HD (fide S.Dill), 60 am 24.4. und noch 40 am 6.5.2001 in Kirchentellinsfurt TÜ (R.Armbruster, G.Steinbrinck), 0,1 vom 26.-30.4.2001 in Blaubeuren UL (F.Breit), 30 am 28.4.2001 in Stetten TUT (R.Deschle), 21 ziehend am 1.5.2001 in Ulm (K.Schilhansl u.a.) und 30 am 2.5.2001 in Marbach LB (F.Holzwarth). Invasion am Bodensee: je 2 am 3.1.2001 bei Kesswil/Schweiz (S.Ruppen!) und am 24.3.2001 bei Wasserburg LI (A.Puchta<sup>2</sup>), 20 am 25.3.2001 bei Tettngang FN (K.-H.Bentele), 8 am 26.3.2001 bei Eriskirch FN (G.Knötzsch<sup>2</sup>), am 29.3.2001 mind. 340 im Rheindelta (B.Keist<sup>2</sup>), 12 an der Bregenzer Aachmündung (M.Grabher<sup>2</sup>) und 100 im Eriskircher Ried FN (G.Knötzsch<sup>2</sup>), mind. 1.000 am 30.3.2001 am ganzen See, v.a. bei Eriskirch FN und Hard am Rheindelta (G.Juen, F.Portala u.a. fide D.Koch\*), mind. 900 zwischen 31.3. und 6.4.2001 im Eriskircher Ried FN (W.Frenz, M.Hemprich, G.Knötzsch & M.Schleicher<sup>2</sup>), max. 92 zwischen 1.4. und 4.5.2001 bei Bodnegg RV (R.Martin, H.Merten), 60 am 4.4.2001 bei Weingarten RV (fide R.Ortlieb<sup>2</sup>), am 7.4.2001 255 im Rheindelta (P.Willi<sup>2</sup>), 502 bei Schwarzach/Vorarberg (J.Ulmer<sup>2</sup>) und 95 im Eriskircher Ried FN (G.Knötzsch<sup>2</sup>), 50 am 12.4.2001 bei Lindau (A.Puchta<sup>2</sup>), 33 am 16.4. und 13 am 22.4.2001 in Ravensburg (B.Schaud<sup>2</sup>), 100 am 19.4.2001 bei Radolfzell KN (S.Werner<sup>2</sup>), >70 am 22.4. (S.Schuster<sup>2</sup>), 35 am 24.4. und 70 am 28.4.2001 (S.Werner<sup>2</sup>) auf der Mettnau, 120 am 20.4.2001 bei Tettngang FN (W.Frenz<sup>2</sup>), 300 am 22.4.2001 bei Markdorf FN (O.Graf & M.Schleicher<sup>2</sup>), 155 am 29.4.2001 bei Immenstaad FN (H.Schlüter<sup>2</sup>), 2 am 2.5.2001 im Eriskircher Ried FN (C.Braunberger\*), 12 am 5.5.2001 bei Bermatingen FN (G.Knötzsch<sup>2</sup>) und 1 am 17.5.2001 bei Meckenbeuren FN (M.Hemprich<sup>2</sup>).

**Hausrotschwanz:** Im Bodenseegebiet je 1 überwinternd in Singen KN und am Hohentwiel KN (S.Schuster<sup>1</sup>), außerdem zumindest Überwinterungsversuche in Rielasingen KN (1,0 singend am 8.12.2000 und 26.1.2001, S.Werner<sup>1</sup>), in Freiburg FR (1 vom 3.-15.1.2001, F.Bergmann), in Uttwil/Schweiz (1 am 4.1.2001, M.Schaad<sup>1</sup>), in Kreuzlingen/Schweiz (1 am 14.1.2001, H.-G.Bauer<sup>1</sup>) und bei Oberfahlheim NU (1 am 17.1.2001, K.Schilhansl).

**Schwarzkehlchen:** Überwinterungsversuche im Rheindelta (je 1 am 6.12., W.Leuthold<sup>1</sup>, am 17.12., B.Keist<sup>1</sup>, am 27.12.2000 und 3.1.2001, A.Schönenberger & J.Ulmer<sup>1</sup>) und im Freiburger Rieselfeld (0,1 am 3.1. und 22.1. und 1,1 am 13.2.2001, H.Schwarz), außerdem 0,1 am 7.1. und 27.1.2001 in den Elzwiesen EM (J.Rupp) und 1,0 am 21.1.2001 beim Osterried BC (H.Epple, G.Nandi, K.Schilhansl).

**Braunkehlchen:** 0,1 bereits am 29.3.2001 an den Klärteichen Offenau HN (H.Furrington, M.Wieland). Große Rastbestände am Rohrsee RV mit bis zu 70 am 18.9. und 100 am 19.9.2001 (K.Bommer).

**Ringdrossel:** Je 1 bereits am 4.2.2001 bei Engen KN (E.Sonnenschein<sup>1</sup>) und am 3.3.2001 im Donau- moos UL (K.Schilhansl). Im Raum Albstadt BL max. 27 am 7.4., 34 am 8.4. und 23 am 26.4., außerdem 1 am 17.10.2001 (M.u.R.Handschuh, C.Cullmann). 1 am 22.4.2001 bei Achstetten BC (G.Nandi).

**Schlagschwirl:** Je 1,0 singend am 10.5.2001 im Langenauer Donau moos UL (K.Anka) und am 6.6.2001 am Hagstaffelweiher KN (M.Basen & H.-G.Bauer<sup>2</sup>).

**Sumpfrohsänger:** 1,0 singend bereits am 27.4.2001 bei Konstanz (M.Basen<sup>2</sup>).

**Teichrohrsänger:** In der Wägbachniederung KA/HD 2,0 singend schon am 1.4. (J.Ewald\*), am 16.4.2001 bereits zahlreich im gesamten Schilfgebiet (U.Mahler), am Bodensee je 1,0 singend ab 6.4.2001 auf der Mettnau KN (S.Schuster<sup>2</sup>) und am 8.4.2001 im Wöllmatinger Ried KN (B.Porer<sup>2</sup>), außerdem 1,0 singend am 12.4.2001 im Dürbheimer Moos TUT (A.Brall).

**Marikensänger\*:** 1 Fängling am 5.10.2001 auf der Mettnau KN (D.T.Tietze, H.Reinhardt).

**Orpheusspötter\*:** 1 Sänger am 9.5.2001 bei Auggen FR (D.Kratzer), je 1 am 15.5.2001 bei Rielasingen KN und von Mitte Mai bis 30.5.2001 in Singen KN (OAG Bodensee<sup>2</sup>).

**Weißbartgrasmücke\*:** 1 am 28.4.2001 im Rheindelta (OAG Bodensee<sup>2</sup>).

**Mönchsgrasmücke:** 1,0 frischtot am 2.1.2001 in Feudenheim MA (K.Batsch, G.Rietschel), 1,0 singend (!) am 12.1.2001 in Stuttgart (B.Lorinser), je 0,1 am 18.1. und 11.2.2001 in Entringen TÜ (M.Riebesell, H.Stadelmaier) sowie am 2.2. und 23.2.2001 in Konstanz (H.u.H.Jacoby<sup>1</sup>) und 2,0 (1 kurz singend) am 6.2.2001 in Meckenbeuren FN (M.Hemprich<sup>1</sup>).

**Grünlaubsänger\*:** 1,0 vom 3.-29.7.2001 in Meckenbeuren FN (M.Hemprich, G.Juen, H.Epple, G.Nandi; M.Deutsch, O.Graf, G.Knötzsch u.v.a.<sup>2</sup>; M.A.Neumann, D.Kratzer, T.u.W.Lang u.a.\*).

**Gelbbraunlaubsänger\*:** Nachtrag: 1 am 1.10.2000 bei Ertingen BC (J.Günther).

**Fitis:** 1,0 singt noch am 23.9.2001 in der Wägbachniederung KA/HD (U.Mahler).

**Zilpzalp:** Wieder Überwinterung an der Kläranlage Radolfzell KN (4 am 21.12.2000 und 2.1.2001 sowie 3 am 13.2.2001, S.Schuster<sup>1</sup>) und bei Dagersheim BB (3 vom 1.1. bis mind. 6.3.2001, J.Männich), außerdem 3 am 1.1.2001 auf der Insel Reichenau KN (G.Jung<sup>1</sup>), 2 am 14.1.2001 bei Zienken FR (K.Andris), je 1 am 16.1.2001 bei Pfahlbronn WN (A.Sombrutzki), am 17.1.2001 in Meisenschwarm bei Neuenburg FR (K.Andris) und am 21.1.2001 bei Untermarchtal UL (W.Fischer, J.Günther u.a.) sowie 4 am 25.1.2001 an der Laiblachmündung/Bodensee (J.Ulmer<sup>1</sup>).

**Sommergoldhähnchen:** 1 am 14.1.2001 in der Wilhelma S (M.Schmolz).

**Trauerschnäpper\*:** 1,0 am 14.2. (an einem Futterhäuschen) und 0,3 am 21.2.2001 in Bad Liebenzell CW (K.Stöffler).

**Bartmeise:** 60 am 16.1.2001 im Wöllmatinger Ried KN (F.Schmidt & U.Zeidler<sup>1</sup>), 1 am 11.3.2001 am Rohrsee RV (K.Bommer), mind. 150-155 vom 23.9.-3.10. (U.Mahler, F.Weick) sowie noch mind. 100 am 4.11. und 10.11. und >70 am 2.12.2001 (M.Wink\*) in der Wägbachniederung KA/HD.

**Mauerläufer:** Je 1 am 11.2.2001 bei Wüppingen UL (M.Schmid\*), am 14.2.2001 bei Eningen RT (H.J.Riedinger), am 22.2.2001 bei Seeburg RT (T.Strasser) und am 23.3.2001 im Ermstal RT (F.Schmid).

**Beutelmeise:** 3 am 21.1.2001 an der Radolfzeller Aachmündung KN (S.Werner<sup>1</sup>), 1-2 bereits am 10.2. und 2 durchziehend am 18.2.2001 in der Wagbachniederung KA/HD (U.Mahler), 6 am 23.3.2001 am Schmiechener See UL (J.Kuhn) und sogar 40 am 24.3.2001 bei Unlingen BC (M.Fischer, J.Günther, B.Roth).

**Pirol:** 1,0 ziehend am 18.9.2001 entlang eines Fichtenwaldrandes beim Rohrsee RV (K.Bommer).

**Elster:** 2 beim Nestbau am 4.1.2001 in Neufra BC (K.Bommer).

**Nebelkrähe:** Je 1 am 4.2.2001 bei Konstanz KN (H.Fries) und am 14.4.2001 bei Freistett OG (K.Hochberger fide G.Müller).

**Rosenstar\*:** 3 am 2.6. (S.Trösch, H.-G.Bauer, A.Schönenberger, J.Ulmer u.a.<sup>2</sup>) und 4 am 4.6.2001 (F.Furrer<sup>3</sup>) im Rheindelta.

**Bergfink:** 1,0 singend am 27.5.2001 auf dem Gipfel der Hornisgrinde FDS/OG (M.Förschler<sup>4</sup>).

**Zitronengirlitz\*:** 2 am 20.5.2001 bei Rielasingen KN (OAG Bodensee<sup>2</sup>).

**Girlitz:** 80 am 15.1. und 124 am 24.1.2001 in einem Rapsfeld bei Zazenhausen LB (T.Buzogány) sowie 16 am 28.1.2001 bei Duttonberg HN (K.Endmann).

**Karmingimpel:** Je 1,0 singend am 24.5.2001 in Meckenbeuren FN (M.Hemprich<sup>2</sup>) und vom 3.-4.6.2001 im Rheindelta (A.Schönenberger<sup>2</sup>, D.Bruderer<sup>2</sup>).

**Schneeammer:** 2 durchziehend am 19.10.2001 bei Konstanz (M.Basen\*).

**Zaunammer:** 1 vj. am 13.4.2001 bei Neulußheim HD (Wu.M.Jansen) und am 19.4.2001 1,0 bei St.Leon HD (S.Dill).

**Zippammer:** Überwinterung am Hohentwiel KN zwischen 2.12.2000 und 9.3.2001 (H.-G.Bauer, W.Frenz, G.Knötzsch, S.Olschewski, I.Weiß, S.Werner u.a.<sup>1</sup>) von bis zu 13 (3.3.2001, S.Werner<sup>1</sup>). Außerdem 2 am 21.1. und 5 (3,2) am 28.1.2001 zwischen Dossenheim und Schriesheim HD (M.Wink\*).

**Ortolan:** Max. 27 am 26.4. (W.Zanola<sup>2</sup>), 12 am 27.4. (A.Täschler<sup>2</sup>), 16 am 28.4. (J.Ulmer<sup>2</sup>) und 9 am 5.5.2001 (T.Epple, G.Juen, G.Nandi u.a.) im Rheindelta sowie 17 am 27.4.2001 bei Dingelsdorf KN (B.Porer<sup>2</sup>). 1,0 singend am 1.4.2001 in den Elzwiesen bei Niederhausen EM (T.Ullrich).

**Graunammer:** 1,0 erstmals singend am 15.2.2001 bei Konstanz (M.Basen\*).

---

\* (am Artnamen und am Datum) vorbehaltlich der Anerkennung durch die jeweilige Seltenheitenkommission

OS = Orn. Schnellmitt. Bad.-Württ. N.F.

Ausgewertete Medien (Symbole am Beobachternamen):

<sup>1</sup> in Ornithologischer Rundbrief für das Bodenseegebiet Nr. 160, April 2001

<sup>2</sup> in Ornithologischer Rundbrief für das Bodenseegebiet Nr. 161, August 2001

<sup>3</sup> in Ornithologischer Rundbrief für das Bodenseegebiet Nr. 162, Oktober 2001

<sup>4</sup> in BARTHEL, P.H. (2001): Bemerkenswerte Beobachtungen. Dezember 2000 bis Februar 2001.- Limicola 15: 44-62

<sup>5</sup> in BARTHEL, P.H. (2001): Bemerkenswerte Beobachtungen. März und April 2001.- Limicola 15: 119-133

<sup>6</sup> in BARTHEL, P.H. (2001): Bemerkenswerte Beobachtungen. Mai 2001.- Limicola 15: 173-184

<sup>7</sup> in BARTHEL, P.H. (2001): Bemerkenswerte Beobachtungen. Juni und Juli 2001.- Limicola 15: 231-246

<sup>8</sup> in BARTHEL, P.H. (2001): Bemerkenswerte Beobachtungen. August und September 2001.- Limicola 15: 292-312

\* Mitteilungen aus dem GermanBirdNet

## Schlafplatzzählungen

zusammengestellt von Jochen Hölzinger und Ulrich Mahler

**Kormoran:** - *Bodensee:* starker Rückgang der Winterbestände im Rheindelta (ca. 70, P.Willi<sup>1</sup>), im Raum Lindau (bis 57, A.Puchta<sup>1</sup>) und im Eriskircher Ried FN (ca. 50, G.Knötzsch<sup>1</sup>), Stockacher Aachmündung KN bis 68 am 15.12.2000 (H.Werner<sup>1</sup>), Radolfzeller Aachmündung KN 450 am 14.12.2000 (S.Schuster<sup>1</sup>), 500 am 17.2. (S.Werner<sup>1</sup>) und 380 am 9.3.2001 (S.Schuster<sup>1</sup>), Wollmatinger Ried KN max. 175 am 3.1. (K.Büchle<sup>1</sup>) und 133 am 18.2.2001 (H.Jacoby<sup>1</sup>). - *Hoch- und Oberrhein:* Altrhein Wyhlen LÖ 34 am 7.9., 72 am 14.9., 110 am 18.9., 115 am 29.9., 148 am 12.10., 180 am 14.10., 150 am 27.10. und 20.11. und 160 am 21.12.2000 (K.Kuhn) sowie 153 am 20.1., 125 am 17.2., 60 am 13.3., 90 am 16.3. und 80 am 21.3.2001 (E.Gabler, K.Kuhn); Rheinstau Kembs/Elsaß 259 am 18.11. und 273 am 16.12.2000 sowie 291 am 20.1. und 229 am 17.2.2001 (E.Faißt); Wagbachtiederung KA 70 am 30.1., 95 am 10.2., 112 am 11.2., 86 am 6.3. und 91 (incl. Brutvögel) am 26.3., 70 am 23.9., 65 am 24.9. und 107 am 7.11.2001 (U.Mahler; M.Wink<sup>\*</sup>); Neckar bei Ladenburg HD 100 am 5.5. und 90 am 10.11.2001 (M.Wink<sup>\*</sup>). - *Donautal:* Öpfinger Stausee UL 270 am 10.1., 300 am 26.1., 300 am 28.2., 280 am 6.3., 540 am 7.3., 250 am 16.3. und 8 am 30.4. sowie 65 am 16.9.2001 (K.Bommer); Tuttlingen 70 am 19.1.2001 (J.Günther); Sigmaringen 130 am 7.2.2001 (K.F.Gauggel); Faiminger Stausee DLG 455 am 25.2.2001 (H.J.Eder, J.Günther, B.Roth) - *Neckartal:* Oberndorf RW 26 am 12.1.2001 (J.Günther); Pleidelsheim LB 1 am 27.1., 226 am 26.2., 162 am 27.3., 110 am 7.4., 38 am 28.4., 10 am 26.5., 5 am 23.6. und 11 am 22.7.2001 (J.Blessing; H.Schlüter<sup>\*</sup>); Unterensingen ES 340 am 28.1.2001 (J.Deuschle); Mühlen FDS 36 am 2.2.2001 (J.Günther); Eyach FDS 14 am 26.3.2001 (J.Günther). - *Übriges Land:* Aalkistensee PF 68 am 7.1., 76 am 18.2., 76 am 16.3., 25 am 17.4., 5 am 22.5., 7 am 17.6. und 11 am 8.7.2001 (J.Blessing); Sindringen KÜN 17 am 4.2. und 90 am 11.2.2001 (G.Unger).

**Gänsesäger:** 15,13 am 20.1. und 16,16 am 17.2.2001 auf dem Altrhein Wyhlen LÖ (E.Gabler).

**Schwarzmilan:** Im Wollmatinger Ried KN 13 am 18.3. (H.Jacoby<sup>2</sup>), 35 am 24.3. (D.Heinz<sup>2</sup>), 38 am 28.3. (H.Fries<sup>2</sup>), 75 am 23.4. (B.Porer<sup>2</sup>), 34 am 11.5. (H.Jacoby<sup>2</sup>) und 78 am 25.6.2001 (H.Jacoby & W.Mosbrugger<sup>2</sup>) sowie 34 am 11.5.2001 im Rheindelta (M.Roost<sup>2</sup>).

**Kornweihe:** Im Radolfzeller Aachried KN bis zu 4,12 am 27.1. (A.Brall<sup>1</sup>), 6,12 am 19.2. (S.Werner<sup>1</sup>), 3,18 am 9.3. (S.Schuster<sup>1</sup>) und 7,22 am 10.3.2001 (S.Werner<sup>1</sup>), 2 juv. am 27.10., 10-12 (1,0 subad., 1,0 2.KJ) am 5.11. und 3-4 (1,0 subad.) am 11.11.2001 in den Tiefenbronner Seewiesen PF (J.Hönle<sup>\*</sup>).

**Lachmöwe:** 2.200 am 7.1.2001 mit 15 **Sturmmöwen** im Stuttgarter Hafen (M.Pfiz<sup>\*</sup>), 3.500 am 27.1.2001 in Basel (E.Gabler, K.Kuhn), auf dem Öpfinger Stausee UL 300 am 6.3., 600 am 10.3. und 700-800 am 16.3.2001 (K.Bommer).

**Uferschwalbe:** 250 am 26.3.2001 im Schilf der Wagbachtiederung KA (U.Mahler).

**Rauchschwalbe:** 100 am 26.3.2001 im Schilf der Wagbachtiederung KA (U.Mahler).

**Bergpieper:** Im Radolfzeller Aachried KN >100 am 3.12. und >110 am 19.12.2000 (S.Schuster<sup>1</sup>), 140 am 20.1. (A.Brall<sup>1</sup>), >190 am 6.2. und noch 70 am 28.2.2001 (S.Schuster<sup>1</sup>), im Eriskircher Ried FN 40 am 2.12.2000 und 30 am 8.2.2001 (G.Knötzsch<sup>1</sup>).

**Bachstelze:** 80-100 am 26.3. (G.Freundlieb) und mind. 60 am 1.4.2001 (U.Mahler) im Schilf der Wagbachtiederung KA.

**Elster:** Mind. 38 am 19.12. und mind. 160 am 30.12.1999 sowie mind. 97 am 22.1. und 195 am 1.2.2000 im Tappachtal Stuttgart, mind. 45 am 23.12.1999 und 117 am 2.1.2000 im Friedhof Zuffenhausen S (T.Buzogany), 128 am 6.1. und 149 am 10.2.2001 am Mindelsee KN sowie 220 am 8.1.2001 bei Leonberg BB (S.Bosch).

**Saatkrähe:** 1.200 am 12.1.2001 bei Lörrach LÖ (E.Gabler).

**Rabenkrähe:** Am 1.1.2001 80 bei Oberwilzingen UL und 250 bei Hayingen RT (J.Günther, C.Kiefer), 5.000 am 2.1. bei Pforzheim PF und 200 am 6.1.2001 auf der Mettnau KN (S.Bosch), 80 am 23.1.2001 im Stuttgarter Schloßgarten (T.Buzogany), 2.500 im Januar und 1.500 im Februar 2001 bei Kreßbronn FN (A.Puchta & L.Ramos<sup>1</sup>).

**Star:** In der Wagbachniederung KA 700 am 10.2. und 1.000 am 4.3. (U.Mahler), mind. 3.000 am 10.3. (M.Wink\*), 4.000-5.000 am 29.6. (T.u.WLang), mind. 40.000 am 23.9. und 200.000 am 7.10. (M.Wink\*), 300.000-500.000 am 25.10. und ca. 200.000 am 5.11.2001 (U.Mahler, H.Schlüter, C.Walter u.a.), im Schilf an den Kiesseen Rißtissen UL 300 am 26.2., 4.000 am 9.3., 4.000-5.000 am 14.3. und 5.830 am 22.9.2001 (K.Bommer), 600 am 1.4.2001 am Unteren See LB8, 25 am 17.4. am Aalkistensee PF, 1.600 am 30.3., 1.100 am 13.5. und 400 am 29.6.2001 am Roßweiher PF (J.Blessing).

**Bergfink:** 15.000 am 18.2.2001 in einem kleinen Fichtenbestand am Albtrauf zwischen Wittlingen und Seeburg RT (W.Schmid\*).

**Grünfink:** 150 am 3.3. (U.Mahler) und mind. 300 am 10.3.2001 (M.Wink\*) im Schilf der Wagbachniederung KA.

### Nahrung und Ernährungsverhalten verschiedener Vogelarten zusammengestellt von Jochen Hölzinger und Ulrich Mahler

**Schnatterente:** In der Wagbachniederung KA schmarotzen im Januar 2001 zahlreiche Ind. bei **Bläßhühnern** und **Höckerschwänen**, die Hornkraut (*Ceratophyllum demersum*) tauchend bzw. grünelnd hochholen. Einige **Pfeifenten** profitieren ebenfalls davon. (U.Mahler)

Am 26.1.2001 fressen am Bodenseeufer bei Kesswil/Schweiz 170 Ind. zusammen mit 28 **Pfeifenten** Wasserpflanzen (vermutlich Wasserpest *Elodea nuttallii*), die in Mengen vom Wellenschlag ans Ufer geworfen wurden. (P.Willi<sup>1</sup>)

**Stockente:** Am 4.9.2001 verzehren 125 Enten auf einem abgeernteten Rapsacker beim Rohrsee RV Nacktschnecken. (K.Bommer)

**Rohrweihe:** Am Rohrsee RV schlägt 0,1 am 16.4.2001 eine ad. Lachmöwe. (K.Bommer)

**Mäusebussard:** Am 5.3.2001 holt sich 1 Bussard in Bad Liebenzell CW zwei Grasfrösche aus dem Feuchtgebiet beim Thermenhotel. (K.Stöffler)

Am Rohrsee RV erbeutet 1 Bussard am 30.4.2001 nach niedrigem Rütteln über der Verlandungszone zwei Frösche. (K.Bommer)

**Turmfalke:** 1,0 schlägt am 21.7.2001 am Ufer des Rohrsees RV eine flügge juv. Bachstelze. (K.Bommer)

**Wanderfalke:** An den Wernauer Baggerseen ES schlägt 1 ad. am 4.9.2000 einen juv. Dunkelwasserläufer, der jedoch schwer verletzt entkommen kann. (J.Günther)

Am 27.2.2001 sprengt 1 juv. im Emmelhofer Moos RV in über 100 m Höhe aus einem Trupp mit 15 fliegenden Kiebitzen einen Vogel heraus, der neben dem Falken fast bis zum Boden trudelt. Der Kiebitz versucht dann, an seinen Trupp Anschluß zu bekommen, wird aber noch viermal vom Wanderfalken im Steigflug attackiert, wobei der Kiebitz jeweils wieder stark an Höhe verliert. Der letzte Angriff endet hinter einem 20 m hohen und 150 m langen Geländerücken, hinter dem beide Vögel nicht mehr auftauchen. Die Suche nach einer Rupfung blieb in dem sehr unübersichtlichen Gelände ergebnislos. (H.Merten)

Bei Ersingen UL drängt 1 Ind. am 20.7.2001 aus einem Schwarm von 1.000 Saatkrähen ein juv. ab und schlägt es über freiem Feld. (K.Bommer)

1 Falke schlägt in der Abenddämmerung des 26.9.2001 innerhalb von 20 min hintereinander 4 Fledermäuse (wohl Abendsegler *Nyctalus noctula*) ohne Fehlversuch und kröpft sie auf einem Hochspannungsmast in der Wagbachniederung KA/HD. (G.Freundlieb, C.Walter)

**Bläßhuhn:** Sehr große Wintergesellschaften im Dezember 2000/Januar 2001 am Schweizer Bodenseeufer (Kesswil-Utwil bis 7.000 am 26.1.2001; P.Willi<sup>1)</sup>) und im Ermatinger Becken KN (bis 20.000 am 17.12.2000; H.Jacoby<sup>1)</sup>) ernähren sich wohl hauptsächlich von den dichten Wasserpflanzenbeständen (Armleuchteralgen *Chara spec.*, Wasserpest *Elodea nuttallii*). (OAG Bodensee<sup>1)</sup>)

**Grünschenkel:** 1 Ind. frißt am 19.9.2001 in der Wagbachniederung KA/HD einen kleinen Frosch (wohl Teichfrosch *Rana lessonae*). (G.Göring)

**Ringeltaube:** 2 verzehren am 18.3.2001 vorjährige Eicheln in einem Wäldchen beim Rohrsee RV. (K.Bommer)

**Türkentaube:** 1 Ind. frißt am 9.5.1999 in Stuttgart u.a. Löwenzahn- und Kleeblätter. (W.Riedel)

**Kuckuck:** Am 29.4.2001 fliegt im Emmelhofer Moos RV nach einer langen Regenperiode 1 Männchen von einem Abspanndraht eines Hopfenpfahles dreimal in einen frisch gepflügten Hopfengarten und nimmt dort Regenwürmer auf. (H.Merten)

**Bachstelze:** Am 25.6.2001 fliegen in einem Rotwildgehege bei Kaltenbronn CW 2 Stelzen die äsen den Hirsche an, setzen sich auf deren Rücken und picken bzw. schnappen nach den zahlreichen Fliegen und Mücken, die auf den Hirschen sitzen bzw. diese umschwärmen. (G.Adam)

**Seidenschwanz:** Die Ind. am 30.3. und 1.4.2001 im Weingartener Moor KA (siehe oben) ernähren sich von Mistelbeeren (*Viscum album*). (J.Hönle\*; V.Schmidt\*)

Auch die meisten Trupps der Invasionsvögel am Bodensee (siehe oben) ernten die reichen Mistelbestände. (OAG Bodensee<sup>2)</sup>)

Vom 13.-27.4.2001 ernähren sich bis zu 191 Ind. am Breitenauer See HN u.a. von Beeren des Gemeinen Schneeballs (*Viburnum opulus*) und von Knospen und Trieben einer Buschweide (*Salix spec.*) sowie von Espe (*Populus tremula*), Esche (*Fraxinus excelsior*) und Spitzahorn (*Acer platanoides*). (C.u.M.Wieland)

**Rotkehlchen:** Im Januar und Februar 2001 fliegt am Max-Eyth-See S 1 Ind. fast täglich auf die Hand und nimmt dargebotene Brotstückchen auf. (G.Adam)

**Schwarzkehlchen:** Am 24.2.2001 frißt 0,1 Regenwürmer im Zeller Donaubogen BC. (J.Günther, B.Roth)

**Braunkehlchen:** 2 juv. fressen vom 4.-6.9.2000 Beeren des Hartriegels (*Cornus sanguinea*) an den Wernauer Baggerseen ES. (J.Günther)

**Zilpzalp:** Am 18.7.2000 pickt 1 Ind. Blattläuse von einem stark befallenen Apfelbaum bei Ergenzingen TÜ. (W.Riedel)

**Mönchsgrasmücke:** 1 Männchen und 5 Weibchen verzehren am 24.9.2001 in Aalen die Beeren der Zwergmispel (*Cotoneaster integerrima*). (W.Schmid)

**Trauerschnäpper:** 9 Ind. fressen am 18.9.2001 beim Rohrsee RV u.a. Holunderbeeren (*Sambucus nigra*). (K.Bommer)

**Schwanzmeise:** 3 fressen am 17.1.2001 an einem verfaulten Apfel am Baum bei Kappishäusern ES. (M.Dallmann)

**Neuntöter:** Am 20.6.2001 jagt 0,1 eine vorbeifliegende Vierflecklibelle (*Libellula quadrimaculata*) an den Wernauer Baggerseen ES mind. 100 m weit. Die Libelle entkommt schließlich im Steilflug nach oben. (G.Adam)

**Eichelhäher:** 3 verzehren am 18.3.2001 auf der Landstraße bei Obergreut RV die Reste überfahrener Erdkröten (*Bufo bufo*). In Osterhofen RV fängt 1 Häher am 22.7.2001 einen Sägebock (*Prionus coriarinus*). (K.Bommer)

**Rabenkrähe:** Im Mai und Juni 2001 nutzen in Stuttgart bis zu 20 Krähen das Nahrungsangebot eines Passanten, der Tauben füttert, und nähern sich diesem bis auf 2 Meter. Wenn der Mann weiterläuft, hüpfen und flattern die Krähen regelrecht hinter ihm her. (G.Adam)

**Star:** Am 23.2.2001 bei starkem Schneefall in Riedlingen BC hängen 10 Ind. an Meisenknödeln. (H.Stroh)

Mehrere Ind. fressen am 2.8.2000 an Frühäpfeln und am gleichen Baum Blattläuse in Ergenzingen TÜ. (WRiedel)

30 Stare verzehren am 19.8.2001 in Laupheim BC die Früchte der Eibe (*Taxus baccata*). (K.Bommer)

**Haussperling:** Am 6.8.1998 fliegen in Ergenzingen TÜ 3 Sperlinge von einem Hausdach aus immer wieder schräg nach oben, um etwas aus der Luft zu schnappen. Wahrscheinlich fangen sie fliegende Ameisen, die an diesem hochsommerlichen Nachmittag schwärmen (WRiedel).

10 Sperlinge fressen Beeren des Feuerdorns (*Pyracantha coccinea*) am 12.11.2000 in Hausen GP. (J.Günther u.a)

**Buchfink:** Bei Reutlingendorf UL verzehren am 15.4.2001 zahlreiche Ind. (zusammen 80,10) Regenwürmer vom Fahrweg. (K.Bommer)

**Girlitz:** 8 Ind. ernähren sich am 25.3.2001 zusammen mit 2 **Stieglitzen** von den Samen des Rainfarns (*Tanacetum vulgare*) und der Vielblütigen Königskerze (*Verbascum spec.*) beim Bahnhof unlingen BC. (K.Bommer)

**Stieglitz:** Am 23.9.2001 ernähren sich in Laupheim BC von den Samen der Gemeinen Nachtkerze (*Oenothera biennis*). (K.Bommer)

**Birkenzeisig:** 4-8 Ind. fressen zwischen dem 28.1. und 26.3.2001 an den Zapfen der Lärche (*Larix decidua*) in Aalen. (WSchmid)

**Goldammer:** 0,1 fängt am 30.6.2001 eine kleine Libelle am Rohrsee RV. (K.Bommer)

## Berichtigungen

*Orn. Schnellmitt. Bad.-Württ. N.F. 65:*

**Nahrung und Ernährungsverhalten verschiedener Vogelarten**

**Schwarzstorch:** 1 juv. rastend am 28.8.2000 am Baggersee Bühl TÜ und nicht auf der Zuflucht (M.Förschler, A.Hachenberg):

**Halsbandsittich:** Die 5 Sittiche im Heidelberger Bergfriedhof wurden am 18.9.1998 beobachtet, als sie die Früchte des Runzelblättrigen Schneeballs (*Viburnum rhytidophyllum*) fraßen. (E.Schäffner)

## Zugplanbeobachtungen Wegzug 2000

zusammengestellt von **Christoph Randler**

**Graureiher:** 14 am 30.9.2000 in 2,5 h am Lotterberg LB (J. Blessing, C., J. & J. Völm).

**Wespenbussard:** 26 am 26.8.2000 bei der Ruine Teck ES in 4 h (J. Günther).

**Rohrweihe:** 7 am 1.9.2000 bei der Ruine Teck ES in 4 h (J. Günther, U. Bayer), 8 am 10.9.2000 bei Ochsenwang ES (J. Günther, B. Roth).

**Kornweihe:** 6 am 15.10.2000 am Lotterberg LB in 6 h (J. Blessing, C. Völm).

**Mäusebussard:** 282 am 13.10.2000 in 2 h übers Eriskircher Ried FN (T. Epple), 81 am 23.10.2000 über den Wernauer Baggersee ES (J. Günther) sowie 317 am 1.11. in 4 h, 165 am 7.11. in 1,5 h und 166 am 21.11.2000 ebenfalls in 1,5 h am Segelflugplatz Ergenzingen TÜ (D. Kratzer, C. Pielsticker).  
**Ringeltaube:** 6.435 am 8.10.2000 in 3,25 h am Lotterberg LB (J. Blessing), 19.265 am 12.10.2000 im Eriskircher Ried FN in 2 h (T. Epple) und 5.899 am 15.10.2000 in 3,5 h Zuflucht FDS (M. Förschler).  
**Maursegler:** 6.304 am 16.7.2000 in 3,5 h über dem Queckbaggersee TÜ (D. Kratzer, C. Pielsticker).  
**Heidelerche:** 74 am 8.10.2000 in 2 h über Oppingen UL (T. Epple), 203 am 12.10.2000 in 2 h im Eriskircher Ried FN (T. Epple), 145 am 15.10.2000 in 6 h am Lotterberg LB (J. Blessing, C. Völlm) und 168 am 15.10.2000 in 3,5 h über Zuflucht FDS (M. Förschler).  
**Mehlschwalbe:** 170 am 25.9.2000 in 40 min über Rottweil RW (A. Brall).  
**Wiesenpieper:** 500 am 1.11.2000 in 4 h über Ergenzingen TÜ (D. Kratzer).  
**Ringdrossel:** 11 am 19.10.2000 in 3,5 h über die Teck ES (J. Günther).  
**Amsel:** 281 am 30.9.2000 in 3 h bei Zuflucht FDS (M. Förschler).  
**Misteldrossel:** 208 am 30.9.2000 in 3 h bei Zuflucht FDS (M. Förschler).  
**Singdrossel:** 485 in 3 h am 20.9.2000 bei Zuflucht FDS (M. Förschler).  
**Schwanzmeise:** 12 am 1.10.2000 in 1,75 h bei Rosswälden GP (J. Mayer).  
**Erlenzeisig:** 252 m 16.10.2000 in 4 h bei Zuflucht FDS (M. Förschler) und 439 am 1.11.2000 in 3,25 h am Lotterberg LB (J. Blessing, C. Randler, C. Völlm).  
**Saatkrähe:** 1.223 am 26.10.2000 in 3 h über Riedlingen BC (J. Günther).

*Om. Schnellmitt. Bad.-Württ. N.F. 66/67: 35-36*

### **Fichtenkreuzschnäbel *Loxia curvirostra* verzehren Streusalz und werden von Kraftfahrzeugen überfahren**

Von Klaus Bommer

Am 6. Januar 2002 hielt ich den Wagen gegen 11.30 Uhr beim Durchfahren des Weilers Niedernzell/Lkr. Biberach-Riss an (Koordinaten MTB 7826, SW, 10.00/48.09, 543 m NN). Schon von weitem war zu erkennen, dass sich wenigstens 15 Fichtenkreuzschnäbel mitten auf der Fahrbahn niedergelassen hatten, um Streusalz aufzunehmen (vgl. auch GLUTZ VON BLOTZHEIM & BAUER 1997). An dem Beobachtungstag herrschte bei Windstille frostiges, sonnig-klares Wetter. Die Tiefsttemperaturen lagen nahe bei - 15° C. Tagsüber wurden kaum 0° C erreicht. Das Rottal ist an dieser Stelle nur 800 Meter breit und wird beidseitig von den ausgedehnten Fichtenwäldern *Picea abies* der „Holzstöcke“ begleitet.

Aus dem PKW heraus gelangen anschließend Nahbeobachtungen von 6,7 Kreuzschnäbeln auf 5 bis 10 Metern Entfernung. Dabei war deutlich zu sehen, dass die Vögel beim Nahrungserwerb den Kopf schief hielten und die Salzkörner mit der Zunge aufleckten. Im Femglas war selbst die rosa-, rötliche Zunge, die wiederholt aus dem Schnabel heraus bewegt wurde, zu erkennen. GLUTZ VON BLOTZHEIM & BAUER (1997) beschreiben exakt denselben Vorgang. Bisweilen nahmen die Vögel auch Schnee auf, der in Resten am Fahrbahnrand lag. Dabei blieb es ungeklärt, ob die Vögel nicht auch im Schnee enthaltene Salze verzehrten. Es ist nicht unbedingt von der Hand zu weisen, dass die Vögel durch die verstärkte Salzaufnahme durstig geworden waren. Dahingegen erklärt BEZZEL (1993) die Konzentration des Fichtenkreuzschnabels auf ölhaltige Samen mit erhöhtem Trinkbedürfnis bzw. Schneefressen im Winter.

Die Landstraße 7580, die von Gutenzell nach Schwendi führt, ist keineswegs stark frequentiert, durchläuft aber den Weiler Niedernzell mit einer geradlinigen Trassenführung, so dass ohne weiteres höhere Tempi als die erlaubten 60 Kilometer/Stunde erreicht werden. Zwei schwere Limousinen, bepackt mit Skiausrüstung, durchfuhren die kleine Ortschaft so rasant, dass den Kreuzschnäbeln nicht ausreichend Zeit zum Wegfliegen blieb. Vorher hatte ich vergeblich versucht, die Fahrzeuge durch Handzeichen abzubremsen. Es war bitter, den Verkehrstod von je einem Männchen und Weibchen der Kreuzschnäbel selbst mit anschauen zu müssen. In einem anderen Fall konnte die kleine Schar gerade noch vor einem herannahenden Fahrzeug entkommen. Bereits vor meiner Ankunft lag ein überfahrenes Weibchen auf der Straße. Ein weiteres totes Weibchen fand ich etwas später in dem einen Kilometer entfernten Weiler „Weitenbühl“. Auch hier zeigten andere Fichtenkreuzschnäbel (mindestens 2 Männchen und vier Weibchen) dasselbe Verhalten des Salzaufleckens. Bei der nachmittäglichen Kontrolle wurden zusätzlich drei tote Männchen in Niedernzell gefunden.

Die Fichtenkreuzschnäbel nahmen von den toten Artgenossen auf der Fahrbahn keine Notiz und ließen sich auch durch den Verkehr nicht davon abbringen, gleich nach dem Vorbeifahren eines Fahrzeuges wieder auf die Straße zurückzufliegen.

Da die Tiere auf der Fahrbahn gut zu erkennen waren, hätten die PKW-Fahrer mühelos das Tempo drosseln können. Die erlebte Rücksichtslosigkeit ist Ausdruck unserer Zeit.

Zum Verkehrstod des Fichtenkreuzschnabels findet sich in GLUTZ VON BLOTZHEIM & BAUER (1997) ein interessanter Hinweis auf Seite 998. In den USA wurden vereinzelt Massenverluste bekannt, wobei es unklar blieb, ob die Kreuzschnäbel dem Verkehr oder dem auf der Straße zur Kontrolle der Staubentwicklung ausgemachten Calciumchlorid zum Opfer gefallen waren.

### Literatur

GLUTZ VON BLOTZHEIM & BAUER (1997); Handbuch der Vögel Mitteleuropas, Bd. 14/11 - Passeriformes - Fringillidae. – Wiesbaden (Aula-Verlag).

BEZZEL, E. (1993): Kompendium der Vögel Mitteleuropas. Passeres-Singvögel. – Wiesbaden (Aula-Verlag).

### Klaus Bommer

Stettiner Str. 11, D-88471 Laupheim

*Om. Schnellmitt. Bad.-Württ. N.F. 66/67, 2000: 36-37*

### Berausende Wirkung des Wilder Wein auf Amseln

Von Klaus Bommer

Wilder Wein *Parthenocissus quinquefolia* - auch Selbstkletternde Jungfernebe oder Kletterwein genannt - ist eine Rankpflanze aus der Familie der *Vitaceae*, die 1622 von Nordamerika nach Europa eingeführt wurde. Heute wird sie bevorzugt zum Eingrün von Haus- und Mauerwänden angepflanzt. Bis zum Herbst entwickelt die Pflanze zahlreiche blauschwarze, erbsengroße, Beeren mit einem Durchmesser von 4 bis 6 Millimetern, die im Winterhalbjahr ein begehrtes Vogelfutter darstellen (vgl.

Literatur). Die Beeren weisen jeweils 2 bis 3 herzförmige Samenkörner auf. Nach MAYR (1995) sind in ihnen chemisch unbekannt Giftstoffe vorhanden.

Der Verzehr der Samen durch Amseln *Turdus merula* wurde vom Verfasser mehrmals beobachtet, wie zuletzt am 3.12.2000, als 3 Vögel in Laupheim BC die Beeren an einer hohen Hauswand ernteten (vgl. HÖLZINGER, MAHLER & STOHL 2001) oder am 2.12.2001, als 5 Vögel in Laupheim dieselben Beeren an einer Garagenwand abpflückten. Die Amseln nahmen dabei selbst „unbequeme“ Körperhaltungen bzw. -bewegungen wie Anklammern, Vorbeifliegen oder Hochspringen in Kauf.

Ein neues Verhalten konnte im Spätherbst 2001 bei meinem Arbeitgeber, einem Laupheimer Maschinenbau-Unternehmen, verzeichnet werden. Im windgeschützten, lediglich nach oben offenem Innenhof der Industriegebäude rankt sich Wilder Wein großflächig an zwei Bürobauten bis in 6 Meter Höhe. Hier hatten sich am 13. und 14. Dezember 2001 bei großer Kälte – tags und nachts herrschte starker Frost mit maximal -17°C – bis zu 12 Amseln eingestellt, um sich ausschließlich von den Weinbeeren zu ernähren. Im Tagsverlauf wurden von jeder Amsel wenigstens wohl zwischen 30 und 50 Beeren aufgenommen. Die reiche Nahrungsquelle bot sich bis etwa Weihnachten. Soweit wäre nichts Besonderes daran gewesen, wenn nicht zwei Kollegen, deren Arbeitsplatz sich in unmittelbarer Nachbarschaft befindet, unabhängig voneinander davon berichtet hätten, dass die Vögel nach dem Verzehr der Trauben torkelnd-taumelnd, jedenfalls aber unkontrolliert wegflogen. Wiederholt kam es auch zu leichten Anflügen gegen die großen Scheiben der Bürofenster, obwohl diese vor langer Zeit schon mit Greifvogelattrappen beklebt worden waren. Nach den Kollisionen blieben die Amseln benommen liegen, um sich jedoch bald darauf wieder zu erholen. Tödliche Unfälle oder starke Verletzungen waren nicht zu verzeichnen.

Die Anzeichen sprechen dafür, dass die Amseln durch die zuckerreichen „vergorenen Eisbeeren“ gewissermaßen berauscht worden waren. Im Zusammenhang wäre es wissenschaftlich, ob andere Beobachter ähnliche Feststellungen machen konnten. In demselben Innenhof hielten sich daneben zwei Rotkehlchen *Erithacus rubecula* sowie ein Männchen des Hausrotschwanz *Phoenicurus ochruros* auf, die sich ebenfalls und zum überwiegenden Teil von den Früchten des Wilden Weins ernährten. Der Hausrotschwanz war in der Zeit von Ende Oktober bis zum 5. Dezember 2001 anwesend. Das beschriebene Rauschverhalten wurde bei diesen Vogelarten nicht beobachtet.

### Literatur

GLUTZ VON BLOTZHEIM & BAUER (1988): Handbuch der Vögel : Mitteleuropas, Bd. 11/II. – Aula (Wiesbaden).

HÖLZINGER, J., U. MAHLER & C. STOHL (2001): Nahrung und Ernährungsverhalten verschiedener Vogelarten. – Orn. Schnellmitt. Bad.-Württ. N.F. 65 (April 2001).

KREMER, B. P. (1992): Steinbachs großer Naturführer - Bäume und Sträucher. – Mosaik-Verlag (München).

MAYR, C. (1995): Giftfibel - Giftstoffe aus der Tier und Pflanzenwelt. – Bechtermünz-Verlag (Augsburg).

SCHNABL, H. (1998): Vogelfutterpflanzen. – Arndt-Verlag (Bretten).

**Klaus Bommer**

Stettiner Str. 11, D-88471 Laupheim


**Ornithologische Literatur mit Bezug auf  
Baden-Württemberg ab 1990**

Folge 21 (2001): Nummern 1040-1070

Zusammengestellt von **Jochen Hölzinger**

1040. Anonymus (1999): Ein Miteinander für die Natur. – D. Jäger in Bad.-Württ. 1/1999: 17-19.
1041. BOSCHERT, M. (2001): Rotmilan *Milvus milvus* ertrinkt beim Versuch zu fischen. – Limicola 15: 262-264.
1042. GATTER, W. (2000): Vogelzug und Vogelbestände in Mitteleuropa. 30 Jahre Beobachtung des Tagzugs am Randecker Maar. – Wiebelsheim (Aula).
1043. HANSING, D. (2001): Es gibt wieder Störche in Weinheim. – Naturkdl. Bl. Weinheim 3 (2): 32-38.
1044. HAVELKA, P., & K. HEPP (2001): Der Kolkkrabe (*Corvus corax*) im nördlichen Baden-Württemberg und den angrenzenden Gebieten. – Charadrius 37: 116-122.
1045. HÖLZINGER, J. (2001): Ringeltaube (*Columba palumbus*) verdrängt Türkentaube (*Streptopelia decaocto*) vom Brutplatz. – Orn. Jh. Bad.-Württ. 17: 223-224.
1046. FÖRSCHLER, M. (2001): Witterungsbedingte Ausweichbewegungen des Zitrinengirlitzes *Serinus citrinella* im Nordschwarzwald. – Orn. Beob. 98: 209-214.
1047. KUGEL, V. (2001): Vogelhaltung im Blühenden Barock. Aktuelle Situation und Perspektiven für die Zukunft. – Kauzbrief 14: 33-34.
1048. LECHNER, M. (2001): Jahresbericht über ornithologische Beobachtungen im westlichen Kreis Ravensburg. – Ornika 13: 1-58.
1049. LIESER, M., A. FLENDER, B. SCHERER & H. SCHONHARDT (2000): Zum Populationsrückgang des Auerhuhns (*Tetrao uragallus*) im östlichen Schwarzwald. – Mitt. bad. Landesver. Naturkde. Naturschutz N.F. 17: 619-629.
1050. LISSAK, W. (2000): Ergebnisse der Winter-Wasservogelzählung im Flusssystem der Fils (Landkreis Göppingen) im Winter 1999/2000. – Naturkdl. Mitt. Lks. Göppingen 19: 24-32.
1051. LISSAK, W., & M. NOWAK (2000): Ornithologische Beobachtungen aus dem Landkreis Göppingen 2000. – Naturkdl. Mitt. Lks. Göppingen 19: 33-56.
1052. LUDER, R., & C. STANGE (2001): Entwicklung einer Population des Steinkauzes *Athene noctua* bei Basel 1978-1993. – Orn. Beob. 98: 237-248.
1053. MATT, D. (2001): Haubentaucher (*Podiceps cristatus*) verschlingt Sonnenbarsch. – Naturkdl. Bl. Weinheim 3 (2): 45.
1054. MATT, D. (2001): Eine Gänsegesellschaft am Waldsee in Weinheim. – Naturkdl. Bl. Weinheim 3 (2): 47-48.
1055. MATT, M. (2001): Vergebliche Versuche einen Höckerschwan (*Cygnus olor*) zu retten. – Naturkdl. Bl. Weinheim 3 (2): 39-44.
1056. MEBS, T. (2001): Aktuelle Verbreitung und Arealerweiterungen des Sperlingskauzes (*Glaucidium passerinum*) in Deutschland. – Kauzbrief 14: 4-12.

1057. MÜLLER, J., & M. SCHMIDT (2000): Nachweis von *Crataerina melbae* (Diptera: Hippoboscidae) auf Alpenseglern *Tachymarptis melba* in Freiburg im Breisgau. – Orn. Jber. Mus. Heineanum 18: 129-138.
1058. RANDLER, C. (2001): Verbreitung und Bestand von Halsbandschnäpper *Ficedula albicollis*, Baumpeiper *Anthus trivialis* und Neuntöter *Lanius collurio* im Stromberg. – Orn. Jh. Bad.-Württ. 17: 213-221.
1059. RANDLER, C. (2001): Field identification of hybrid wildfowl – Geese. – Alula 7: 42-48.
1060. RANDLER, C. (2001): Field identification of hybrid wildfowl – Dabbling Duck. – Alula 7: 82-91.
1061. REICHELT, G. (2001): Arche Noah in der Riedbaar – Zur Entwicklung einiger angelegter Biotope 1978-1998. 2. Teil: Biotopkomplex „Am Wuhrholz“. – Schr. Ver. Gesch. Naturgesch. Baar 44: 151-180.
1062. SCHLENKER, R. (2000): Die „Naturgeschichte der Vögel Deutschlands“ \*(1805-1821) von Johann Wolf und Bernhard Meyer. – Rudolstädter nat.hist. Schr. 10: 101-116.
1063. SCHMOLZ, M., & W. RIEDEL (2000): Ornithologische Beobachtungen im zoologisch-botanischen Garten Wilhelma in Stuttgart. – Jh. Ges. Naturkde. Württ. 156: 249-277.
1064. SCHNEIDER-JACOBY, M. (2001): Auswirkungen der Jagd auf Wasservögel und die Bedeutung von Ruhezonern. – Laufener Seminarbeitr. 1/01: 49-61.
1065. Schweizerische Gesellschaft für den Weissstorch, Altreu (2001): Schweizer Brutvögel in Deutschland – 2001. – Der Weissstorch in der Schweiz, Bull. 2000/2001, Nr. 30: 31-31.
1066. Schweizerische Gesellschaft für den Weissstorch, Altreu (2001): Ringfundmeldungen 2000 von Schweizer Störchen im Ausland. – Der Weissstorch in der Schweiz, Bull. 2000/2001, Nr. 30: 33-36.
1067. SINGER, U. (2001): Lina Hähnle – Naturschützerin aus Passion und Ehrenmitglied unseres Vereins. – Schwäbische Heimat 2001/3: 279-281.
1068. SINGER, U. (2001): Ein Herz für die Vogelwelt. Die Giengenerin Lina Hähnle hat 1899 den Bund für Vogelschutz gegründet. – ostalb einhorn 28/März 2001: 46-53.
1069. STICKROTH, H. (2001): Invasion des Seidenschwanzes *Bombycilla garrulus* im Winter 2000/2001 in Schwaben. – Ber. naturwiss. Ver. Schwaben 105: 115-117.
1070. WALZ, J. (2001): Bestand, Ökologie des Nahrungserwerbs und Interaktionen von Rot- und Schwarzmilan 1996-1999 in verschiedenen Landschaften mit unterschiedlicher Milandichte: Obere Gäue, Baar und Bodensee. – Orn. Jh. Bad.-Württ. 17: 1-212.



Übersichtskarte von Baden-Württemberg mit den Land- und Stadtkreisen.  
 Aus: Die Vögel Baden-Württembergs. Bd. 4: Folienkarten.